



曝曬芥菜，以供醃製酸菜

在下午除去稻草。

採種圃的選種工作應從苗期開始，發芽後生長第1葉及第1本葉時，認明標準形狀、葉色。如果發現不同形狀，菜色較濃綠或較淡苗，須隨時拔除，以後疏苗時繼續淘汰形質不良苗。

防治毒素病：毒素病是大心芥菜的主要病害，由蚜蟲傳播。不論早生、晚生品種，自苗期須定期施藥防除蚜蟲，以防感染毒素病。毒素病到目前沒有適當農藥防治。毒素病在葉片發生濃淡斑斑甚易鑑識，在採種圃如果發現罹病株，應立刻拔除燒却。毒素病株

不僅使植株矮化，並且減少種子產量。

採種圃選地：大心芥菜採種圃選地，首先要與一般栽培地隔離，選排水良好肥沃的砂質壤土地或壤土地。

整地、定植：使用耕耘機耕耘，並曳引溝犁作成畦面寬1.1公尺的高畦，1畦種2行，行距55公分，株距50公分，苗有5~6葉本葉時，先充分澆水，小心挖苗搬運定植。定植後畦溝灌溉，促進成活。

施肥法：大心芥菜施肥方法，以基肥為主，採種栽培期間長，追肥分作3次。基肥在耕耘前全面撒布或施在畦中央部位，磷鉀施全量，氮及鉀肥施全量，其餘分3次追肥。施肥例如表所示。

採種栽培施肥例

(公斤/10公畝)


肥料名稱	總量	基肥	追肥		
			1	2	3
堆肥	1,000	1,000			
硫酸氨	140	30	30	40	40
過磷酸鈣	70	70	—	—	—
氯化鉀	45	15	—	15	15
時期		整地時	成活時	抽苔始期	抽苔齊期

電子空氣過濾口罩

售價 350元 郵政劃撥 129600號



農友噴灑農藥，防止農藥吸入中毒。
化學工廠員工，防有害氣體吸入體內。
礦工及勞工，防止石粉末吸入肺部，
可預防職業病發生。



《徵求各地經銷商》

台專申字6721194號

甚佳企業有限公司
台北郵政68~1642信箱
電話：(02) 5814719

經銷商：

林章一 台東市寶桑路248巷11號 電話(089) 326262
尚德農藥行 宜蘭縣員山鄉尚德村87號 電話(039) 325032
何德 花蓮縣富里鄉富南村48號