

普滅淨

1000cc.
有原裝貨 及 供應
500cc.

蔬菜、果樹、
雜糧、水稻、其
他雜作殺蟲劑

- ◎具快速殺虫性
- ◎具廣汎殺虫性
- ◎對人、畜低毒

△使用經濟倍數為
2000~3000倍，是目
前世界上最廣泛被使
用的最理想殺蟲劑。

—說明書函索即寄—



德城行有限公司
台北市新生北路二段31-1號
三進大樓六〇〇室
電話：(02)551-8022/3




喝牛奶腹瀉 怎麼辦？

有些人喝牛奶會有腹部絞痛及腹瀉的情形，這是因為牛奶中含有乳糖，乳糖在進入消化道時，必須經過乳糖酵素的分解及消化後才能被小腸吸收。但是有的人因為消化道中缺乏乳糖酵素，所以喝牛奶後便發生腹瀉。

如果你也有這種現象，可以試試飯後再喝牛奶，或飲用經過乳酸發酵的牛奶製品，或喝豆漿（強化豆漿——即添加蛋氨酸的豆漿最好）以代替牛奶，因豆漿不含乳糖。

牛奶因含有我國人較易缺乏的維生素B羣及鈣質，也含有優良的蛋白質，所以牛奶並非嬰兒的專用食品，而是各年齡的人都應該飲用的。（8卷4期“今日食品”）



鉀能改善高血壓

動物實驗顯示，鉀能保護大老鼠使它在高鹽攝食量之下而不會產生高血壓。此種鉀的作用並非僅為被動的角色。一般都知道鉀對腎臟有利尿作用，且會促進鈉的排泄。最近的臨床試驗証實，增加鈉的排泄會跟着降低可觀的血壓高度。

對於鉀在高血壓中所扮演的角色，大家比較熟悉的是鉀能代替鈉（以氯化鉀取代氯化鈉），而此種屬性可能被利用於今後有發展前途的一些可口而不含食鹽的主食品，如麵包之類。

最後的一點，鉀在治療高血壓方面是一種必需的附屬品，以克服因服用 Thiazide 類的利尿劑而腎臟過度排泄的鉀。口服高量的鉀對正常人顯然是不會引起不正常的高量血清鉀，除非是對嬰兒和腎臟受損的人。（摘自8卷4期“今日食品”）

過分包裝

最近同事從日本觀光回來，帶回一盒餅乾分送辦公室同仁共嚐，餅乾口味無甚特色，大家吃完不置可否，倒是那個包裝餅乾的正方形鐵盒，人人讚不絕口，爭着想要。這個餅盒質地精美，橢圓形的蓋子別出心裁，花紋和顏色配合得幾乎無懈可擊，衡量其價值想必比盒內的餅乾還要值錢。

這種外在比內在價高且更引人注目的情況，無以名之，姑名之曰「過分包裝」。值此商場為拓廣銷路競相出奇制勝，挖空心思力求包裝之盡善盡美，誘惑消費者之購買慾的商品不勝枚舉，常見的有化妝品、食品、飲料容器以及各種巧飾擺設等等。