

8稔楊桃

問 我從報紙上得知彰化有生產變種的8稔楊桃，但不知何處可購得此苗？（嘉義縣鹿草鄉三角村毛下行25號陳獻鐘）

答 (1)楊桃果稔一般有5～8稔之多，而以5稔的最多且普遍。照果實經濟價值而論，稔越多，價格不一定好。而以稔少者爲佳。

(2)楊桃稔數的多寡是授粉時所影响，同1棵楊桃樹所結果實稔數無法相同。如8稔的枝條下次所結果實即無法也是8稔。也就是說同一時期所結果，稔數是不能相同。

(3)報載彰化有生產變種之8稔楊桃，可能是在果園中偶而發現的幾粒，也不可能全部皆爲8稔者。（王武彰）

芒果產期調節

問 我現種有200棵芒果，請問(1)在休眠期噴「夏油」90倍液及「馬拉松」100倍液有何作用？可否控制花芽分化？什麼叫做「夏油」90倍？

(2)如何提早開花結果？（No. 5 Speaker Perez Q.C., Philippines 楊金池）

答 (1)芒果休眠期以95%「夏油」乳劑混合「馬拉松」噴布是防治有殼介殼虫，在台灣以95%「夏油」稀釋95倍，50%「馬拉松」稀釋800～1,000倍，並非來信所寫的100倍。菲國全年炎熱，夏油的稀釋倍數應該提高至120倍，僅可在休眠期使用，以上2種藥劑是防治虫害之用，沒有控制花芽的功效。

所謂「夏油90倍」是指夏油1cc加水90cc稀釋。

(2)促進芒果提早開花結果的措施，在四季如夏的菲國可以應用，但植株必須發育健强，枝梢成熟，進行催花才有效果，過去採用果園燻烟1～2週，再過2週後花芽抽出。現在採用化學藥劑，如以硝酸鉀1/100～1/150溶液噴洒頂芽及葉片，7～11天後誘致萌發花芽。或以 Agriblum 作全樹噴布，效果良好，以上3方法都是菲國所盛行。（曾錫恩）

龍眼品種

問 (1)本省龍眼有那些品種？

(2)好的品種應具有那些條件？如何選種？（嘉義縣竹崎鄉塘興村無底潭3號賴伍郎）

答 (1)本省栽培龍眼，以往都以木材爲主果實爲副，龍眼樹成林的在山上放任生長，幾乎沒有什麼管理，所以也不很注意品種的好壞。

龍眼採收以後，多製成龍眼乾或龍眼肉，品種好壞混在一起，都不注意分開，也認爲沒有分開的必要。

近些年來，大家漸漸的認識了龍眼的果品價值，市價增高，栽培者才由林木的經營，慢慢轉成果樹的管理。

龍眼品種很多，本省的品種，幾乎全部是由自然變異產生。實生變異，有好有壞，經栽培者選優汰劣，多年來慢慢才選出一些較好的出來，嘉義農試所及中興大學園藝系，都曾詳細做過檢定的工作，南部有龍目、赤殼、青殼、韶安、陞寮等種，中部有圓粉殼、扁粉殼、大青殼、鳳梨味、梨仔肉等種，詳細資料，請參閱「經濟果樹（下）」第39頁。

泰國的龍眼，好的品種很多，尤其清邁栽培最多，本省現已陸續引入，目前仍在試栽階段。

(2)好的龍眼品種，要具備果形大、種子小、果肉厚、易離核、糖分高、水分少、肉脆、富有香味等優點。單是果大肉厚，有時仍不見得是好品種。南部有1種叫「楊桃葉」的品種，雖然果形很大，但很容易退糖，食之無味，非良種。

你有興趣選種，可於果實成熟時，到各產地詢問就樹選擇，遇有良種便剪採接穗，携回高接，慢慢的就會得到一些好的品種。（黃弼男）

小鴨軟脚

問 我飼養1,000隻菜鴨，出生後3天，下水約半小時，就有10幾隻脚軟不能走路，經過保溫後就可繼續走。請問這是什麼原因？（台北市北投區中央北路1段165號陳書墨）

答 鴨的育雛期約1週，在此期間應等天氣好才放入水池，且入水的時間最多不要超過5～10分鐘，超過鴨子受不了，會着凉，因此會軟脚。（陳晉茗）

