

“新珍”甜脆豌豆

郁宗雄

優良新品種

新珍 (Sugar Snap) 甜脆豌豆 (Snap pea) 是由美國倫堡博士 (Dr. Colvin Lamborn) 苦心育成，並於1979年獲得全美園藝新品種比賽 (All America Selections) 金牌獎，同時已在美國植物品種保護法登錄。在台灣由農友種苗公司取得總經銷權，並於去年秋季開始，在各地區試作，確定極有栽培價值，去秋開始進口種子推廣。

適生食炒食

新珍甜脆豌豆，與過去傳統的莢豌豆 (Pea pot) 及青豆用豌豆 (Green peas) 品種顯然不同，莢豌豆必須在豆莢扁薄豆仁未發育之前採收供食，而青豆用豌豆又必須在嫩子肥大後採收；其時莢壳已纖維發達，品質粗老不能食用。

新珍甜脆豌豆，在嫩子發育肥大時，肥厚的莢肉仍然脆嫩無比，沒有纖維，也就是既有肥大飽滿多汁的嫩子，又有菜豆 (敏豆) 一樣肥厚脆嫩的豆莢，同時可食，且無論生食或炒食，都同樣清甜脆嫩多汁。

植株很強健

植株生長強健，莖蔓粗壯，分枝中等，株高可延伸至2.5公尺，中生，產量豐富。

花白色，一花序1~2莢，嫩莢肥厚鮮綠色，長約8公分，厚約1公分，重約7公克。

肥大多汁的豆仁和肥厚嫩的豆莢同時可食，糖度高達16%，因豆莢重大，採收省工，而且可食率比青豆用豌豆高出2倍。

秋冬季播種

播種適期平地9月~翌年1月，高冷地3~7月，直播栽培。

選排水佳良地方，避免連栽和酸性土壤，有強風的地方也盡量避免使用。(適合和水稻輪栽)。

行距以1~1.2公尺，株距25公分為標準，一穴

播種子3~4粒，發芽後陸續間拔成每穴1~2株。

支柱宜較高，最好用直立式，以便通風透光。先使莖蔓在畦面上匍伏生長，然後再引蔓上支柱，以降低結莢部位，便於採收。

每10公畝地施用堆厩肥1,500公斤，氮素10公斤左右，磷酸15公斤左右，鉀素10~15公斤。氮肥不可過多，追肥視生育情形酌量增減，施用過多則引起徒長，莢莢增加。

病虫害防治


生育期如有白粉病發生，可噴50%免賴得可濕性粉劑加水1,500倍，或用25%蠟離丹可濕性粉劑加水1,000倍。害虫有葉潛蠅和蚜虫等，可用馬拉松防除。在採收期間，如無病虫害發生，最好不噴藥，如噴藥宜用低毒性者。

50天後採收

新珍豌豆播種後50多天開始採收，待豆仁和豆莢都已相當肥大，外觀仍平滑鮮綠色時為適收期。如採收過晚，莢色褪淡，失去光澤，甜味會降低，品質變劣。(不像傳統的莢豌豆在豆莢扁薄時採收)。新珍甜脆豆品質在採收時最好，以後即使用冷藏，甜味及品質仍不斷減低。

採收宜在清晨或低溫時，包裝容器及運輸途中必須注意通氣，以免發熱發酵變色變質。為維持新珍甜脆豌豆的高品質，最好行預冷後低溫運銷系統運銷。

新珍豌豆食用前，宜先用手撕去豆莢的二端，及腹背的筋絲(如圖)，與莢豌豆或菜豆食用前的方法相同。可以作為水果生食，也適於炒食，或者用開水燙漂2分鐘後，用塩或沙拉漿涼拌，風味極佳。



新珍甜脆豌豆食用時先撕去二端及腹背筋絲部位。