

農林廳種苗繁殖場

供應優良種子及種苗

農林廳種苗繁殖場創立於民國2年，原為蔗苗養成所，專門繁殖優良蔗苗。台灣光復後，易名為蔗苗繁殖場。民國41年改名為種苗繁殖場，任務亦改為繁殖農作物種子與種苗。民國52年開始企業化經營，生產優良的種子與種苗供應國內外，並從事育種技術的研究。無論設施或業務，逐年均有擴充，民國65年，又增設屏東分場。

農場規模

總場自營農場80公頃——原種圃、採種圃及試驗圃供農藝作物、園藝作物種苗繁殖和育種研究用。

屏東分場自營農場10公頃——除供農藝作物採種外，並進行瓜類、茄類、蘆筍等育種試驗及雜交種子生產，以及鳳梨、木瓜種苗繁殖工作。

高山採種站——十字花科蔬菜種子及球根花卉與

蘭花類生產。

場外採種農場——各項作物種子生產。

業務範圍

糧食作物種子：雙雜交玉米種子、雜交高粱種子、大豆種子。

纖維作物種子：棉花種子。

油料作物種子：向日葵種子。

蔬菜種子：各類蔬菜種子，包括雜交一代種子及純種種子。

牧草綠肥種子：埃及三葉草、拉丁白三葉草、箭葉三葉草等各種豆科、禾本科及其他牧草飼料綠肥作物。

果樹苗木：葡萄柚、檸檬、鳳梨、木瓜等果苗及砧木。

其他：接受契約委託採種各項種苗。

地址：本場——台中縣新社鄉大南村興中街46號

電話：(045) 872101、872102

郵政劃撥帳號：台中郵局21804

分場——屏東縣麟洛鄉上麟洛溪路1~1號

電話：(087) 333418

農林廳種苗繁殖場各項種子介紹

產品名稱	品 種	特 性	栽 培 適 期
雙雜交玉米	台 南 11 號	早熟、豐產、粒大、橘黃色、適合春作及秋作 抗露菌病及煤紋病。	春2~3月 秋9~10月
玉 米	台南選10號	早熟、豐產、抗旱，株高適栽坡地、抗病強。	春2~3月、秋9~10月
雜 交 高 粱	台 中 3 號	早熟、豐產、矮性、散穗、鈍感、再生力強。	春2~3月、秋7~8月
	台 中 5 號	豐產、矮性、中熟、抗病虫、鈍感、質佳。	春3~4月、秋7~8月
大 豆	高 雄 3 號	早熟、鈍感、莢大、種粒大、植株堅硬、莢數多、產量穩定。	春2~3月、夏6~7月 秋9~10月
	H 15	豐產、生育期短、春夏作約80~85天，全省各地均可栽培。	春2~3月、夏6~7月 秋9~10月
	台 農 4 號	早熟、鈍感、植株堅硬、抗銹病。	春2~3月、夏6~7月 秋9~10月
棉 花	斯 字 棉	適應性廣、纖維長、產量高。	5~7月
雜 交 甘 藍	種 苗 1 號	早熟、耐熱、抗病性強，適夏季栽培，球扁圓堅實重1.1~2公斤，定植後55~60天收穫。	4~9月
雜交花椰菜	極早生45天	極早生、耐熱，適夏栽，花蕾白、花梗淡綠色、球重350~500公克，定植後45天收穫。	4~9月上旬

花椰菜	早生 55 天	早生、耐熱適於夏季栽培，花蕾純白，球重50公克左右，定植後55天收穫。	7月上旬～9月
白 菜	馬 耳	葉梗及葉片多汁，少纖維，耐高溫高濕，生長勢強，生長期短，美味豐產，定植後30～40天可收穫，亦適於直播。	4～10月
	青 梗	葉色濃綠、纖維少、產量高、耐熱性強、適於夏季栽培。	3～9 播種
蘿 蔔	砵 仔 杔	耐熱、早生、根形橢圓，播後55～60天可收。	4～11月
	大 梅 花	晚熟、抽苔晚、不易空心、根質好、根短橢圓，播後 90～100天可收穫。	秋、冬栽培
雜交番茄	158	早生一代雜交種、果色深紅、蘋果形、株勢健旺、耐萎凋病、尻腐病、筋腐病、果實硬度高、果重200～250公克。	6～1 播種
	160	早生一代雜交種、果形整齊、豐產、耐萎凋病和尻腐病、色味俱佳，果重150～200公克。	9～1 播種
	5094	一代雜交種，果色粉紅，生長性強，抗病力強，產量高而穩定，糖度高，果重180～200公克	8～2月
木 瓜	日 陞	結果力強，畸型果少，紅肉，甜度高，早生，定植後8個月即有收成，株高76公分即結果。	北部3～5播種，中南部除1～2月外均可。
西 瓜	紅 雲	具密實系統特性，果橢圓肉深紅，生長強健，抗病力強，產量高而穩定，果皮光滑青黑色，果皮薄而硬，耐儲運。	北部3～5月，中部2～5月，南部1～2月、9～10月，東部1～2月。
	紅 娘	生長勢、抗病力特強，耐旱、果肉鮮紅，品質風味好，結果力強，果皮淡綠網紋，產量高，耐儲運。	
牧 草	單 葉 豆	可放牧或製乾草，亦為良好之果園覆蓋作物。	5月
	白花三葉草	多年生，深根豆草，生育強健，長有匍匐莖及白色球狀花，為潤濕溫帶地優良牧草，酸鹼度為中性（pH5.5～6.5）與禾草混作青刈，果園間作可作家庭放牧之用。	春4～5月 秋8～9月
	苕 子	2年蔓生豆科，適合各種土壤，為酸性紅土良好冬季豆科亦宜塩分地，海拔1,500公尺以下或山地均能生長，為優良飼料，牛、豬、雞、火雞、鵝、家兔均嗜之，曬乾、青貯均可亦可作冬季裏作綠肥。	9～11月播種
	黑 麥 草	1或2年生，但自播性強，因此草地建立後一如多年生，適溫暖地帶，過冷、過熱、過乾、過濕均非所宜。以肥沃粘土最佳，耐酸性，在pH5的土壤仍然繁茂。混植生長快，可青刈或乾貯，適1年短期牧場。	9～11月

紅 燕 麥	爲秋播越冬2年生禾草，似燕麥，但分蘗性及抗銹病較佳，生育健旺，燕麥適於冷涼氣，紅燕麥却可在南部突破燕麥後期乾旱及稍高溫度之適應界限，冬季栽培爲宜，對土壤適應性大，耐瘠薄土，除砂土及石灰土外均生長良好。	9~11月
賽 貂 豆	全省海拔1,000公尺以下均宜，播種或扦插均可，爲多年生蔓性攀緣豆科植物，但初期生長迅速，習性與他種豆科迥然不同，且對氣候及土壤適應性強，霜害後復生亦迅速。	5月 春、夏
埃及三葉草	牧草、綠肥兼用，生長迅速，適於中、北部水田冬裏作、果園冬作及秋植蔗田間作綠肥及牧地之冬季豆科，可與燕麥、黑麥草混播。分多刈與單刈兩種型系，一爲播種後在春季刈一次的單刈型。一爲多刈型，播後50天始刈，此後每30天刈一次，最後一次5月收穫。	二期水稻收穫前後5~10天
恭 榮	產量豐富，爲春夏之交適宜。新鮮飼料，宜冷涼氣候，若高溫多濕之地，雖地上部分生育旺盛，但地下部分產量減少，適當平均溫度12.5~19°C，表土深又具有適量濕度之砂土，或植質壤土有適度腐植質之砂土或石灰土頗良好，粘重土發育不良。莖葉可晒爲乾芻，塊根製簽。本省地區可用作秋播之冬作。	9~11月
泰 樂 豆	生育強健，耐低肥力土地，自播性強，可與多種禾本科牧草混作。作水土保持或牧野改良。	在潤濕適當時機全年均可播種，本省南部以4~6月較適但幼苗怕霜，避免遲播。
營 多 藤	爲一種溫暖地區的多年生豆科植物適宜在果園中種植作爲覆蓋作物。覆蓋全面後可開始刈取約1尺長嫩枝葉供爲兔、雞、豬、牛青飼料。	3~10月間播種
苜 蓿	一般雖認爲平地草，但1,000公尺以下山坡地亦適宜，惟幼苗柔弱，種植前應清除雜草。土壤缺根瘤菌，應予播種前先接種，播種後注意排水，最忌高溫多雨，爲供放牧應與禾草混植，以免發生腹脹症亦可收穫乾草。	春2~3月 秋10~11月
燕 菁	喜濕涼氣候，12~20°C最理想，自微鹼性至強酸性的各種土壤均宜，故海岸砂土與高山紅粘土都能生長良好，除氣溫上升或發生芽蟲外，很少病害。可供人畜食料或青貯。	平地9~12月 高山5~7月
大 貂 草	單年生禾草外形似玉米，株高達3公尺，在台灣9月底或10月初開花，12月即成熟。喜高溫多雨肥沃濕潤土壤。	北部4~6月 南部3~5月