

普通名稱	劑	型	有效成分	含量%	商品名稱
芬瑞莫	乳	劑	α -(2-chlorophenyl)- α -(4-chlorophenyl)-5-pyrimidinemethanol	12.5	Rubigan

②使用方法及範圍：

注 意 事 項

使用 方 法		使用範圍
每公頃 每次用藥量	稀釋倍數	
150公撮	8,000	葡萄白粉病
	4,000	芒果白粉病
0.1—0.15公升	10,000	胡瓜白粉病
0.25公升	4,000	西瓜白粉病

①發病初期開始施藥，每隔10天噴藥1次，共3—4次。
②採收前9天停止用藥。

①發病初期開始，每隔10天噴藥1次，到幼果形成時為止，約2—4次。
②加展着劑。
③採收前6天停止用藥。

①發病初期開始每隔10天施藥1次，連續3次。
②加展着劑。
③採收前3天停止用藥。

①發病初期開始每隔10天施藥1次，連續施藥3次。
②加展着劑。
③採收前3天停止用藥。

最新出版

216位專家學者執筆，資料最新，權威鉅著，精裝兩大冊，封面綉印，古雅精緻，機關團體必備，家庭個人實用美觀。

台灣農家要覽

農發會贊助 發行人：李崇道 豐年社印行

內容：農業資源、農場經營、農產運銷、土壤肥料、糧食作物、特用作物、園藝作物、林業、水土保持、農田水利、植物保護、畜牧、獸醫、漁業、農產品處理及加工、農業機械、農村環境與衛生等17大章。上下兩大冊，合計2695頁。

定價：1200元（模造紙本）

（郵購另加掛號郵資30元）

豐年社

郵政劃撥5930號·台北市溫州街14號