

嵌紋病普遍出現在蔗園，病葉呈黃綠相間不規則的嵌紋，褪色現象明顯，嚴重時有壞疽紅色枯斑。目前並無藥劑可防治，所以在選種時必須注意，並防治蚜虫。

處理蔗種以防病


矮化病是近年來頗受注目的甘蔗病害，受害植株矮小，縱剖病莖的節部，可見部分橙紅色。避免此病須注意採種，或在種植前，將蔗種以攝氏50度的熱水處理兩小時。

鳳梨病病莖的切口變紅色，後來轉變為黑色而腐爛，以致不能萌芽。縱剖病莖會發生一種鳳梨香味，所以稱為鳳梨病。可用50%免賴得可濕性粉劑稀釋 1,000~1,500倍，或50%蓋普丹可濕性粉劑稀釋 500倍，或50%伏賜丁可濕性粉劑稀釋 500倍，浸苗1分鐘，再種植於田間。

噴藥防治螟虫

虫害方面，最重要的是螟虫。螟虫能侵入莖內部，引起枯心現象。如在田間有枯心現象，應立即割除，並殺死莖中幼虫。幼蔗時期可用45%一品松，或50%撲滅松乳劑，稀釋1,000倍，每公頃1,200公升，施於田間。

地下害虫方面有蔗龜、金針虫



紅甘蔗好待選

，影响甘蔗的萌芽生長。可在種植前，施用5%繁福松粒劑，或10%福瑞松粒劑，或10%必滅松粒劑，或10%托福松粒劑防治，使用量請參考植物保護手冊。

甘蔗鋸天牛幼虫也會為害蔗苗，引起植株枯萎，應捕殺成虫和幼虫。甘蔗線蚜的分泌物會導致煤煙病發生，使甘蔗生長受阻，可噴50%馬拉松或25%滅賜松乳劑，稀釋1,000倍防治。

最新出版

216位專家學者執筆，資料最新，權威鉅著，精裝兩大冊，封面綉印，古雅精緻，機關團體必備，家庭個人實用美觀。

台灣農家要覽

農發會贊助 發行人：李崇道 - 豐年社印行

內容：農業資源、農場經營、農產運銷、土壤肥料、糧食作物、特用作物、園藝作物、林業、水土保持、農田水利、植物保護、畜牧、獸醫、漁業、農產品處理及加工、農業機械、農村環境與衛生等17大章。上下兩大冊，合計2695頁。

定價：道林紙本1500元，模造紙本1200元。

(郵購另加掛號郵資30元)

豐年社

郵政劃撥5930號 • 台北市溫州街14號