

園藝新知



種苗處理：爲防治粉介殼虫及心腐病，種植前用47%巴拉松乳劑2,000倍，另加50%蓋普丹400倍混合液浸苗3分鐘後倒置在通風處，經1周才可種植。如遇乾旱爲了促進發根，將種苗基部乾葉剝去，裔芽基部小果及吸芽木質部也應切除。

施用基肥：爲減少植後追肥次數，種植前將全期肥料的氮肥30%，磷肥全量，鉀肥50%（亦即每公頃施硫酸銨960公斤（尿素418公斤），過磷酸石灰880公斤，硫酸鉀640公斤）施於行間土壤中作爲基肥，剩餘肥料分三次於翌年6、9、11月施用於植株基部葉腋。

敷蓋塑膠布：鳳梨園用黑色塑膠布覆蓋，不但有保持土壤溫度和水分，防止雜草發生，促進鳳梨生長，節省費用等的效果，同時並有減少肥分流失的功能

，所以施用基肥應配合敷蓋塑膠布才能發揮作用。方法爲園地整妥後，依栽植距離測量行距，以便在畦上行間施下基肥，充分與土壤混合，然後將塑膠布順種植畦方向滾鋪，即可依塑膠布上預先打洞的位置種植。

種植：台農4號鳳梨植株較矮小，適於密植，以畦距100公分（3.3台尺），行距50公尺（1.7台尺），株距30公分（1台尺），二列式三角形種植，每公頃約40,000株。種苗應以冠芽、裔芽、吸芽分類，再依大、中、小分別種植。種植期於8~10月爲適期。

施用殺草劑除草：鳳梨園因覆蓋塑膠布，行間不易長草，但畦間未蓋塑膠布的地方仍會長草，所以種植後在畦間地面需用“達有龍”殺草劑400~500倍均勻的噴洒一次，每公頃用藥量1.5~2公斤，翌年4、5月間雨後再同樣濃度噴一次，即可控制鳳梨園一



巴拉刈

溶劑24%

係一種無選擇性之殺草劑，藥效迅速！

復興農藥股份有限公司

公司地址：台北市萬大路二八九號二樓
電話：(02) 3017881 · 3017981
工廠地址：桃園縣楊梅鎮上田里營盤脚13隣8之2號
電話：(034) 785238

本廠急徵：

1. 廠長、副廠長各一名：
歡迎同業老手加入，
大專機械、化工科系畢，
月薪2萬~5萬，
詳面洽。
2. 管理人員一名：
公務人員退休者可
3. 操作員二名

意者，請寄簡歷或直接
來電至台北辦事處即可。

本廠產品，品質優良，
信用可靠，暢銷海內外。