



生長素處理過與未處理過後的比較

般雜草的發生。

灌溉、防蟻；介壳虫及萎凋病也為台農4號鳳梨的主要病虫害，所以種植後1個月、4個月、7個月需用47%巴拉松乳劑2,000倍液灌注植株心部，每株100c.c.，每次灌藥時加尿素1%混合施用可兼施肥效果，灌藥同時另以0.3%滅蟻樂餌劑，撒施鳳梨園四周地面，每公頃3公斤以防治螞蟻。

產期調節；台農4號鳳梨在自然狀態下，果實生產期在6月初至7月底，為調節產期避免集中，以提高

售價，宜在秋季8、9、10月間將生長滿1年的植株，用0.5%的電石水於午夜後處理，每株50CC，可促進提早於3、4、5月間生產。

生長素處理：台農4號鳳梨是以鮮銷為目的，因此果肉質地、風味、甜度高低等均為鑑定品質的要件，所以盡量不要使用植物生長素，以免影響品質變劣。但為預防乾旱所引起的果梗折斷，處理荷爾蒙SNA的濃度宜在70ppm以下(14,000倍以上)。

除芽：台農4號鳳梨冠芽小，對果實形狀及大小不影響，不必去除及挑心。裔芽約5.6枚，宜在4月間僅留2芽，多餘全部除去，促進果實及裔芽生長。

防晒：果實被烈日照射灼傷，會失去商品價值。種植時採南北向密植。且保留冠芽，可防止日燒果發生。如植株倒伏(宿根作較易發生)宜束葉遮蓋果實預防。

灌水：在乾旱季節每隔2~4周灌水一次，每次10~20公厘，對提高產量及品質有顯著效果。

採收：台農4號鳳梨果實外皮1/3變黃時為採收適期，自開始採收起每2天或3天採收一次，以免過熟影響市場貯運。

養 鴿
靠技術賺大錢！

豐年叢書HV #802

肉鴿飼養



本書特請農發會養鴿專家黃暉煌技正執筆介紹肉鴿品種、鴿舍設計、籠飼設備、飼養器具、飼養管理、繁殖配對、選種方法、疾病防治等技術，及肉鴿食譜。圖版多，封面彩色，25開本，全書56頁。

定價65元 (郵票通用) 平郵寄送免收郵資

豐年社

台北市溫州街14號
郵政劃撥 5930 號

電話：(02) 3938148