

## 4. 選擇優良幼苗

優良健壯幼苗的植株高度應在80公分以上，植株鮮重應在8公克以上，定植時並將植株地上部的葉剪除，以增加定植苗的成活率。健壯幼苗特徵為節間較短，各葉相互抱合，株形整齊粗短。

## 種植適期

本省每年自12月至翌年3月為茭白種植適期，其中以12月中旬～1月中旬最為適宜。茭白種植過早時，因早期溫度較低，苗期發育不良；種植過晚時，則因生育期間縮短，分蘖數減少，而導致降低產量。

## 栽培方法

### 1. 普通栽培法：

種植前選取培育的健壯幼苗，並將幼苗地上部葉鞘剪除，以防種植後幼苗倒伏。種植時按行株距離1.0～0.9公尺定植，栽植深度約為6公分左右，每公頃約可種植12,000株。

## 2. 水稻混合栽培法：

在第1期水稻第2次除草後數天，以適當的距離插植，一般以每隔水稻3行種植茭白1行為準，並以每隔3～4株水稻種植茭白一株為適。種植時宜淺不宜深，因為茭白分蘖能力很強，每株種植一健壯苗即可。

## 肥培管理

茭白吸肥能力甚強，整地時每10公畝施用腐熟堆肥1,500公斤，過磷酸鈣60公斤為基肥，種植後每隔3～4週再施追肥1次。第1次施用硫酸銨20公斤，第2次硫酸銨30公斤混加25公斤過磷酸鈣，第3次硫酸銨35公斤混加氯化鉀10公斤，第4次硫酸銨40公斤，共施追肥4次，但是也需視土壤的肥沃與貧瘠程度而再斟酌增減追肥的次數及用量。施肥方法與水稻相同，在施肥前2天應將田水排乾，施下肥料，並於施肥後2天再行灌水，所有追肥應在採收開始前施完。

## 除草・灌水

茭白種植後如任其自然，則易孳生雜草，影响植

風評越來越好

合乎時代要求的最新稻熱病特效藥

中日合資



三笠農藥



三笠

好米得 粒劑

- 葉、穗稻熱病各施用一次，可得極佳藥效。
- 施藥簡便、吸收迅速、藥效持久(45天以上)。
- 一次施用，勝過一般藥劑噴霧2～3次的藥效。

台灣三笠化學工業股份有限公司

彰化市大竹里大竹莊145號  
電話：(047)232167