

株生育，所以在生長期間應注意防除雜草。除草劑應於種植後3天內，適度的施用如每10公畝施用3公斤，馬上除粒劑可抑制初期雜草生長，降低生產成本。

茭白是水生植物，生育期間田須經常保持有水狀態，水的深度不宜過深，應以保持水深15公分為宜，如有流動泉水或每日能有排水之處，生長發育最為理想。

茭白生育期間除應注意施肥、灌水與除草外，由於茭白的分蘗能力很強，應注意隨時割除細弱無效的分蘗，以促進正常分蘗的生長，並可保持適當的密度與通風，減少病虫害的發生，提高品質與產量。

## 病虫害防治

茭白的病虫害較一般蔬菜為少，生育期間管理不當時則易發生銹病與螟蟲為害。

銹病一般在春夏之交，高溫多濕期發生較多，發病前的預防或於發病初期可選用大生M22或大生M45（400倍液加展着劑），每隔7~10天噴施1次，連續噴施3次，或施用萬力1,000~1,500倍液防治。

螟蟲為害茭白的莖部甚烈，被害的植株地上部枯死或不發育，影响產量與品質甚巨。螟蟲在幼株時期

就開始為害植株，如不及早防治，到生育中期以後，由於植株生育旺盛，分蘗較多且幼蟲已鑽進莖內，防治甚為不易。一般在幼苗生長期間以50%撲滅滅乳劑1,000倍液加展着劑，每隔10~15天噴施1次，防治效果甚佳。

## 採收

茭白於定植後約130日，母莖都已肥大，可以開始採收出售，採收盛期約為定植後150~170天，10公畝產量約1,500~2,000公斤。茭白筍的採收均在早晨或傍晚，以保持穗白筍的鮮嫩，採收時以選取嫩莖肥大而葉鞘稍為裂開的嫩莖，用鐮刀在筍的下方割下，而後將葉片及葉鞘削去。並將6~10枚縛成一束就近出售，若為遠途銷售應以保留葉鞘，裝籠運送，保持濕潤為宜。



日本三共株式會社榮譽出品 立枯病特效藥!!  
全國唯一蒙農林廳正式推廣之水稻秧苗立枯病防治藥劑

# 立枯靈 30%液劑

(殺紋寧·日名：タチガレン)  
殺菌並促進根的發育!! 抗寒害(凍傷)!!

一種農藥多種效果!!

登記證：經市進字第478號

### 立枯靈的特長

- 用立枯靈·確實防止立枯病·及立枯性腐敗症之發生。
- 用立枯靈·可抵抗寒流及早晚溫差大時所造成之凍傷。
- 用立枯靈·可增強根部活力·促進生長確保培育出健康苗。
- 用立枯靈·能促使移植後提早成活並使生長力旺盛。
- 用立枯靈·安全又簡便·可與他種農藥混合使用。

### 國外資料 (僅供參考)

- 立枯靈在國外尚用於防治林木苗木立枯病、瓜類苗立枯病、甜菜立枯病、蔬菜苗立枯病、康乃馨立枯病、甜椒立枯病、菸草舞病、蕃茄苗立枯病、萎凋病、草莓苗立枯病、大豆、紅豆、菜豆等豆科作物白絹病、軟腐病。

台灣總代理 中國化學製藥股份有限公司 台北市襄陽路23號 電話：3816740~9

總經銷 實昌貿易股份有限公司 台北市敦化南路514號之3三樓 電話：7052414 7050155