

農業信箱



——蘇丹李·池田李——

● 池田李及蘇丹李種苗何處有售？價格若干？如何種植管理？在本省何處栽植成功？（雲林縣林內鄉新興9號徐炳釗）

● 目前「蘇丹李」及「池田李」種苗僅在山地有零星出售，每株售價約40~60元左右。有意種植者請與「南投縣霧社國立中興大學園藝試驗場山地果園」聯絡，可供應若干接穗予以繁殖。

這兩種李可互作授粉樹，在海拔地區結果穩定。為增大果粒及品質改進，疏果工作不可缺少。病虫害以縮葉病較易發生。

本省南投1,500~2,000公尺海拔地區均有栽培成功。（范念慈）

——木瓜產量——

● (1)木瓜樹1甲可種植幾棵？每棵距離多少？

(2)木瓜「台農雜交」品種及「日昇」種每年每株產量若干？

(3)木瓜是否為全年開花結果收穫的果樹？

(4)全省各地種植之木瓜產量是否一樣，有無地區之別？花蓮與宜蘭地區產量及經濟期月份各為何？

(5)木瓜自開花到採收期需多久時間？（宜蘭市慶和街23巷3號蕭明溪）

● (1)每公頃可栽植2,000株。木瓜栽植距離為行距2.5公尺，株距2.0公尺。

(2)木瓜產量依氣候（地區）、土壤（質）、品種及肥培管理而異

。一般「台農雜交1號」每株年產量為30公斤，「台農雜交2號」為32公斤，「台農雜交3號」為35公斤「日陸」種為16公斤。

(3)若品種純正優良且肥培管理正常除兩性株於每年2~3月會開畸型花而間斷，及每年因雨量使授粉不良而間斷外，其他時間均可連續開花結果，如此當然可以連續收穫。

(4)全省各地所植的木瓜，因氣候、土質、品種及肥培管理不同，其產量不會一樣。宜蘭地區比花蓮地區溫度低，當然產量會較低，收穫期亦較短，但一般均以3~6月及8~11月產量最高，此即所謂經濟期月份。

(5)木瓜自開花到採收所需時間，因地區及開花期而異，一般於3~4月開花的成熟最快，只需3.5個月。11~12月開花，成熟期最長，約需6~7個月，才會成熟。（王德男）

——荔枝裂果——

● 荔枝在結果時，為什麼會發生裂果？（台南縣大內鄉內郭村4~2號楊靖西）

● 主要的原因是水分失調。尤其在久旱之後，突然下雨，常會有此現象。所以栽培荔枝，在開花結果期中，特別要注意水分調節和土壤管理，水分太多太少都不相宜。

山坡地栽培荔枝，不能單靠自然下雨，尤其在晚春初夏，幼果發育期中，如下雨太少，園地乾旱，必須設法補充水分。

荔枝園地樹冠下，最好能用草類覆蓋，可減少蒸發，保持水分，使土壤疏鬆，減少肥分流失，好處很多。（黃弼臣）

——番石榴疏果期——

● (1)番石榴生食最好的品種為何？

(2)我栽培的番石榴，所着的花大多是三出，應如何實行摘花？

(3)疏果適期為何？（台北縣三峽鎮成福里261~11號王化宇）

● (1)目前生食最好的品種是「梨仔拔」。

(2)三出花多為中央1朵最大，兩側者較小。如實行摘花，應保留中央1枚。

(3)番石榴約在着果1個月內是生理落果最多的時期，如正常果實過多時，應自結果後的1個月，開始實行疏果。（張振宙）

——番茄育苗期——

● 番茄播種育苗，要經幾天才能定植？（苗栗縣卓蘭鎮豐田里85號黃國興）

● 番茄用育苗移植栽培，自播種至定植，高溫期約經22~24日，低溫期約經28~30天。

番茄在台灣以小苗及早定植為原則，如苗床株距太密，更應提早定植，否則易引起徒長。

定植過遲，苗過大，定植後較不易回復生長勢力，且初花易引起落花，而不易結果。（郁宗雄）

