

種植法：爲使生育管理方便宜採畦溝栽植法，種植時依一定的行距先行開種植溝深約20公分，然後再將種球依一定的株距排列於溝中，芽向上，放正再覆土，覆土的程度爲能將整個種球覆蓋而能露出芽體即可，將來經過2～3次培土後原來的種植溝變成畦，原來的畦變成溝。

管理方法

灌溉：洋蔥採種生育過程中，須要充分灌水來供給水份（但需注意不能積水），以促進生長，增加生育，抽苔及採種量，茲以壤土爲例說明之，第1次灌水爲種球種植後即須進行，目的使土壤能與種球密切結合供應水分以使發芽長葉生根，如無灌溉或灌水太慢，則種球會因繼續發芽而得不到水分供給而不能生根，以致整個種球萎縮死亡。第2次灌水爲抽苔期，能促進花莖發育整齊，缺水時花莖瘦小，第3次灌水爲開花盛期，缺水時會降低授粉率影響結實，第4次灌水爲種子發育期，缺水種子會發育不良或不飽滿。

施肥：每10公畝的施肥量如表1。基肥在整地時全面施下，第1次追肥在種球種植後14天施於種植溝再行小培土，第2次追肥在第1次追後第20天，第3

次爲開花盛期，每次施肥配合灌水，增加肥效。

表1：洋蔥採種肥料施用量(公斤/10公畝)

肥 料	總用量	基肥 用量	追 肥 用 量		
			1	2	3
硫 酸 銨	80	40	15	15	10
過磷酸石灰	80	50	15	15	—
氮 化 鉀	45	20	10	10	5

培土：培土可使花莖生長直立促進發育，第1次爲種球種植後第14天進行小培土，第2次爲第1次後第20天，二次即可完成培土，原來的栽植溝成爲畦，原來的畦成爲溝。

除草：洋蔥採種田間除草工作，在二次培土中同時可進行，以後如有雜草發生應去除，以免影響採種生育或傳播病虫害等。

花莖扶持：洋蔥的花莖生長至花苞開裂時即緩慢下來甚至停止，其高度平均爲85公分左右，每一種球平均能抽4～5支花莖，每一花莖着生一個花序，一個花序平均由600～700朵小花組成，因此爲防止花莖



日本三共株式會社榮譽出品

立枯病特效藥!!

全國唯一蒙農林廳正式推廣之水稻秧苗立枯病防治藥劑

立枯靈 30%液劑

(殺紋寧・日名：タチガレン)

殺菌並促進根的發育!! 抗寒害(凍傷)!!

一種農藥多種效果!!

登記證：經市進字第478號

立枯靈的特長

用立枯靈・確實防止立枯病・及立枯性腐敗症之發生
用立枯靈・可抵抗寒流及早晚溫差大時所造成之凍傷
用立枯靈・可增強根部活力・促進生長確保培育出健康苗
用立枯靈・能促使移植後提早成活並使生長力旺盛
用立枯靈・安全又簡便・可與他種農藥混合使用

國 外 資 料

(僅供參考)

立枯靈在國外尚用於防治林木苗木立枯病、瓜類苗立枯病、甜菜立枯病、蔬菜苗立枯病、康乃馨立枯病、甜椒立枯病、菸草猝倒病、蕃茄苗立枯病、萎凋病、草莓苗立枯病、大豆、紅豆、菜豆等豆科作物白絹病、菌軟腐病。



台灣總代理 中國化學製藥股份有限公司 台北市襄陽路23號 電話：3816740～9



總經銷 實昌貿易股份有限公司 台北市敦化南路514號之3三樓 電話：7052414
7050155