

防治：香瓜露菌病 新藥劑 冬瓜炭疽病

福賽得可濕性粉劑 (Fosetyl-Ae)

法國 Rhone-Poulenc 公司新產品（法台化學公司代理），係系統性殺菌劑，在植株內可滲透移行，對藻菌類有防治效果。

(1)有效成分與理化性狀：

有效成分為白色結晶固體，於酸或鹼溶液中較不安定，易被強氧化劑所氧化。

(2)使用方法及範圍：

使用 方法		使用範圍	注 意 事 項
每公頃每 次用藥量	稀釋倍數		
2~3 公 斤	500	香瓜露 菌 病	1.發病初期開始每隔10 天噴藥1次，共計3 次。 2.加展着劑。

(3)毒性：急性經口毒性 LD₅₀對鼠 5,800毫克/公斤，對小白鼠3,700毫克/公斤。

普 通 名 稱	劑 型	有 效 成 分	含量(%)	商 品 名 稱
福 賽 得	可濕性粉劑	Aluminiumtris (O-ethylphosphonate)	80	Aliette

銅合浦(混合)可濕性粉劑 (macuprax)

英國 Mckechnie 化學公司產品（嘉寶公司代理），中性波爾多 (Neutral Bordeaux) 與 Cufraneb 的混合劑，所含銅與有機硫黃有殺菌作用。

(1)有效成分與理化性狀：

硫酸銅有效成分係淺藍色粉末；另一有效成分 Cufraneb 係黃褐色粉末，遇鹼或熱極易分解，其作用類似鋅乃浦。

(2)使用方法及範圍：

使用 方法		使用範圍	注 意 事 項
每公頃每 次用藥量	稀釋倍數		
2~3 公 斤	500	冬瓜炭 疽 病	1.幼果發病時開始施藥 ，以後每隔7天施藥 1次，連續施藥3次。 2.加展着劑。

(3)毒性：急性經口毒性 LD₅₀對鼠 2,800毫克/公斤。

普 通 名 稱	劑 型	有 效 成 分	含量(%)	商 品 名 稱
銅 合 浦 (混合)	可濕性 粉 劑	(1)Basic copper sulphate....73% (Cu: 16%) (2)Cufram Z (Cufraneb 78%)....7%	80	Macuprax

