

# 農業信箱



## 泥鰍池水深

● 一般養泥鰍的水深大約是1台尺左右，但是有一部份養鰻業者兼養泥鰍，鰻魚池水深3台尺以上，居然飼養成效甚佳。不知是何道理？（嘉義縣溪口鄉溪西村243號張坤木）

● 泥鰍需氧量很大，以淺水來飼養是配合其需氧及腸呼吸的特性，減少自底層游至水面的距離，以免消耗太多能量。但如池水太淺易受日曬及鳥類的侵襲。

● 鰻池水深雖達3台尺，但因池中有水車打水循環，氧氣充足，泥鰍不必要再常行腸呼吸，所以水深就沒有關係了。另外鰻池中天然及人工餌料豐富，泥鰍一定長得好。（胡興華）

## 雞痘疫苗接種

● (1) 火雞飼養，大約在2~3斤重的時候，常會發生雞痘，俗稱「臭頭」。聽說要接種雞痘疫苗，請問應如何接種？白火雞雞何處有售？

(2) 中部地區栽培水稻的品種相當多，而目前我所栽培的品種有去年台中區農改場所贈送的「轟早生」品種，雖然品質及收穫量較他種為優，但缺點是植株較高，而生長日數比「豐錦」晚，「豐錦」稻因不屬於政府推廣的品種，稻種無法購得。

而本地一期作後，於二期作中糊仔栽培都是種香瓜，因此需要早生稻品種。目前有否比「豐錦」更早收成的品種？「高雄141號」品種

會比「豐錦」早熟嗎？（台中縣大肚鄉大東村沙田路2段562巷89號趙松潼）

● (1) 小火雞在3周齡時需接種雞痘疫苗，方法是用左手捉住小火雞雙翅，右手拿接種用的穿刺針沾雞痘疫苗，由小火雞翅膀內側翼膜處往外側穿刺，接種後1周，查看是否出痘，亦即在穿刺部位有無米粒狀的突起，如果平平的與原來一樣，表示沒有出痘，必須在不同部位再穿刺1次，直到出痘為止，才有預防效果。

「鳳山市王生明路85號高雄種畜繁殖場」有售白火雞雞，可逕寄明信片說明訂購所需數量，逐次核配。（唐清岑）

● (2) 「轟早生」根據以往試驗成績均高過「豐錦」，但因株高較高不易為農民們所接受，欲防止品種倒伏，可提早於1月下旬插秧，因耐寒性強，早植可提高產量且植株較矮，不會發生倒伏現象，而且可趕在5月中、下旬即可糊仔栽培瓜類。

目前比「豐錦」更早熟的品種很多，因產量大半低於對照品種「高雄選一號」，所以無法申請登記命名推廣。

「高雄141號」比「豐錦」晚熟4~5日。（曾勝雄）

## 茭白筍黑心

● (1) 茭白筍為何會在筍內產生黑色斑點？是否因多年栽培在同一地區所致？

(2) 如何繁殖？（花蓮縣壽豐鄉豐山村222號陳文明）

● (1) 茭白筍是由菰黑穗菌寄生所形成的變態莖，如採筍稍遲或過晚，菰黑穗菌即形成不同程度的孢子堆，在筍的橫切面見之即為不同程度黑色斑點，在筍的縱切面見之，即為條形。至今尚未有適當防治方法，只有採收時期多加注意。

● 多年連栽，對菰黑穗菌本身並無影響。

(2) 一般繁殖用母株的根頭部倒植於水田內，等發生分蘗後，採分蘗定植，或將母株的根頭部分離為單株扦插。（李玉寶）

## 豆皮生產

● 我為了改善生活，增加收入，欲從事豆油皮（豆皮）加工生產，請問：

(1) 黃豆浸漬時間需多久？每季是否不同？

(2) 黃豆與水配合比例應多少？

(3) 為了成品美觀，宜用什麼藥劑漂白？生產過程中應特別注意那些事項？（桃園縣平鎮鄉建安村8鄰56號曾勝坤）

● (1) 黃豆浸漬時間隨季節而異，夏季約5~6小時，冬季約7~8小時。

(2) 黃豆與水配合比例為豆：水=1：10，加水量愈高，豆皮收率也愈高。

(3) 豆乳不應添加漂白劑。生產過程中應注意豆漿保持在80°~95°C通風。（陳文亮）

