




1. 母頭南瓜子 (C. moschata)
2. 「都」種子 F'
3. 黑子南瓜子 (C. ticitolia)
4. 木瓜型南瓜子 (C. Moschata)

瓜，一果果實含有400~500粒種子，目前專供於嫁接砧，是作為胡瓜的砧木。利用黑子南瓜砧所接的胡瓜，在低溫期，其生長性強，因生育最低氣溫的限界為

6°C，又根羣強剛且分佈四方八達，吸肥力也強並抗土壤病害，能使胡瓜提早栽培生產。

黑子南瓜的種子在本省1年約有18,000~20,000公斤。生產輸出口本，本省是生產中心地。現以1公斤5,000粒計算，日本1年所要的砧木約9千萬株（發芽率以90%計管）所耗數量相當可觀。黑子南瓜子也可食用，但較西瓜子味差。甚少供於食用。

一般食用南瓜 (C. moschata, C. maxima, C. Pepo) 的種子均可食用，一般主婦很少丟棄，與果肉煮食，一果果實含有120~150粒種子，筆者據本省的栽培面積來估計，1年約有275,000公斤的種子量（晒乾）。

據1965年以前分析，南瓜種子含有脂肪及蛋白質等，蛋白質為Amino酸的Alginine, Lysine 另含有與海人草及山進寧 (Santonin) 的同一成分，如日常食用攝取能驅除人體內的蛔蟲，家庭如栽培南瓜食用，其兒童的發育良好，身體健康，所以本省60年前經濟情況不良時期，南瓜在鄉下算是重要蔬菜之一。

南瓜以粗放式栽培，如有空地，家家都可以栽培，尤以本省氣候，適於各品種的生育，也耐貯存，應提倡栽培與消費。

豐年社代售農發會叢書

每次郵購另收掛號郵資9元
台北市溫州街14號
郵政劃撥儲金5930號

書名	內容
台灣植物主要害蟲圖說	蔬菜、柑桔、香蕉、茶葉之主要害虫及有害動物，以彩色圖片說明。 26×18 (公分) • 100頁 農發會編 • 120元
An Atlas of general Pathology (家畜病理學圖譜)	英文版精裝銅版紙彩印，適合家畜病理、生物及獸醫學之研究參考。 22.5×28.5 (公分) • 300頁 李崇道等著 • 英文版精裝1000元 • 中譯版100元
台灣產之對蝦類	台灣沿岸或近海之對蝦類各屬種之外形，特徵描素，其中並附精繪之插图。 19×26.5 (公分) • 110頁 李定安/游祥平著 • 120元
南極蝦加工利用研究 (一)	南極蝦乾製品貯藏試驗、罐頭製品試驗、南極蝦粉蛋白質營養價值之測定，新產品之研究發展、南極蝦消費者反應調查研究，另附蝦食譜。 19×26 (公分) • 113頁 農發會編 • 100元
台灣水產加工業實況	魚類冷凍加工品、蝦類、水產冷凍調理、罐頭製造業、煉製品、乾製品、塩醬及藥用品、飼料、工藝品與貝灰、藻類加工業等。 19×26 (公分) • 263頁 蔡森雄主編 • 150元