

(2)使用方法及範圍：

使用 方法		使用範圍	注 意 事 項
每公頃 每次用藥量	稀釋倍數		
1公斤	1,500	草莓灰黴病	1.發病初期開始，每隔7天噴藥一次，計3~4次。 2.加展着劑「全透力」1,000倍。 3.採收前3天停止用藥。

(3)毒性：急性經口毒性 LD50對鼠 16,000毫克/公斤，毒性極低。

美國杜邦 (Dupont) 公司發展成功的混合藥劑，免賴得單劑為系統性殺菌劑，可濕性硫黃為接觸性殺菌劑，二者在國內均已使用多年，綜合二者的特性，可防治白粉病。

硫免賴得 (混合) 可濕性粉劑 (Benlate-S)

(1)有效成分與理化性狀：

普通名稱	劑 型	有 效 成 分	含量%	商 品 名 稱
硫免賴得 (混 合)	可 濕 性 粉 劑	(1)Methyl 1- (butylcarbamoyl) -2-benzimidazole-Carbamate6% (2)Sulfur87%	93	Benlate-S

該種混合劑成品農藥為黃色可濕性粉末，易吸濕，勿暴露於大氣中，須貯藏於乾燥場所。

果蔬農友大福音!! 從開花、結實到豐收——儘管找台和!!

葉面施肥·亦可混合農藥使用

有機質 磷鉀肥
魚精 開花肥
0-10-10

促進花芽分化——果樹催早花 效果奇佳
花蕾肥碩、開花旺盛——着果良好 結實大

美國ALASKA魚肥公司 出品

◆詳細資料歡迎函索◆

果樹·蔬菜用 **花寶 (HYPONeX) 系列!!**

花寶二號
20-20-20

促進果實肥大 糖度增加

花寶三號
10-30-20

促進開花 增加着果率 結實良好

美國The HYPONeX Co., Inc. 製造

地面撒佈
使用方便

《最新奇 特殊土壤改良劑》
——改善水果品質的秘方——

促進着色 提早成熟 糖度增加
強健植物生理機能 增強貯藏力

鈣元 CALGEN
日本ネオゲン株式会社 製造

高單位鈣質
改善土壤
控制氮肥
防止徒長

——各種農業(園藝)肥料、藥品、器材總匯——

台和總代理
總經理 **台和園藝企業股份有限公司**
Taiwan Horticultural Co., Ltd.

台北市士林區中正路104巷1弄2號
台中連絡處：台中市三民路一段164號

郵政劃撥：101360
電話：(02) 831-3302
電話：(042) 223374