

新農藥介紹

防治花生白絹病新藥劑

——蘇明清——

蓋克爛 (混合) 可濕性粉劑 (Dicap)

英國 Boots 化學公司產品 (嘉寶公司代理), 係大克爛與蓋普丹的混合藥劑, 大克爛單劑50%可濕性粉劑, 近年來在國內已使用於草菇菌床白絹病的防治, 蓋普丹係用途極廣的殺菌劑, 可與多種藥劑混合使用。

(1)有效成分與理化性狀

普通名稱	劑型	有效成分	含量%	商品名稱
蓋克爛 (混合)	可濕性粉劑	(1)2,6-dichloro-4-nitroaniline ...25% (2)N-Trichloromethylthio-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide.....25%	50	Dicap

大克爛有效成分為黃色結晶, 熔點 192~194°C, 難溶於水, 蓋普丹純品為白色結晶, 熔點 175°C, 通常


難溶於水。

(2)使用方法及範圍:

使用方法	使用範圍	注意事項
每公斤種子用藥量: 1.25公克	花生白絹病	1.播種前不必加水直接拌種。 2.播種時戴塑膠手套。

(3)毒性: 急性經口毒性LD50對鼠4,040毒克/公斤。

斤。



農藥使用技術指導專欄

