


於眼鏡架上的微計算機（microcomputer）裡，計算機的輸出線連到位於耳後從皮膚內部拉出來的1個永久接頭上。這個接頭通至預先動外科手術放進頭皮下面的1個特佛龍板（Teflonwafer）。板上面有由1,024個電極做成的陣列，位置就在腦子的視覺皮層上，由計算機處理過的見像信號便送到這裡。

目前的估計是人造視覺最佳的結果，也許只能使盲人獲得1種模糊不清的黑白影像輪廓，並不會像常人一般看得巨細靡遺。老實說，就是這種成就，也足使他們能夠獨自作相當的行動而受惠無窮了，事實上，這種期望正是當前科學家們努力以赴的初步目標。

（摘自70年3月號“今日經濟”）



豐年叢書HV#802

養鴿 靠技術賺大錢！

肉鴿飼養

本書特請農發會養鴿專家黃暉煌技正執筆，介紹肉鴿品種、鴿舍設計、籠飼設備、飼養器具、飼養管理、繁殖配對、選種方法、疾病防治等技術，及肉鴿食譜。圖版多，封面彩色，25開本，全書56頁。

定價65元（郵票通用）

平郵寄送免收郵資

豐年社 台北市溫州街14號
郵政劃撥 5930 號

電話：(02)3938148

什麼時候不要喝茶？

下述情況之下最好不要飲茶：

①藥與茶不要齊飲。如貧血時所飲的鐵劑與茶的單寧結合沉澱，不能被吸收。又生物鹼中的咖啡鹼與單寧結合沉澱，如不起化學反應時，與茶飲用就沒關係，但藥物中不知有何成分時，最好不要飲茶較安全。

②不要飲過夜的茶。綠茶的美味依靠成分中的蛋白質，此蛋白質放置時間太久時，容易引起腐敗，單寧的解毒，殺菌作用會沉澱其蛋白質。強黴（mould）易繁殖於單寧中，單寧就失去殺菌效果，所以放過夜的茶易引起中毒。而且沖1次的茶湯放置久時，滲出大量單寧，易引起胃粘膜的障礙。

③睡前不要飲濃茶。不論那1種茶，如綠茶、紅茶、咖啡等都含有咖啡鹼及單寧等，會刺激導致妨害睡眠。但綠茶含有多量的維生素C，可製成脫水茶葉與糖分混合精製茶糖飴之用。

④空腹不要飲太多的濃茶。餐飯尚未料理好時，以飲茶水或嗜好飲料替代食餵，如飲濃茶太多時，因濃茶含有多量的單寧成分，會壓抑着胃液的分泌；或飲濃茶多，暫時得飽至要吃飯時會引起食慾不振之現象。（摘自70年2月號“檢驗”）



今天節目食的學問主持人：
藍梅筠老師精心鉅著兩本食譜——

中華名菜譜
西菜西點精華

是餽送親友最實用的禮物，特價優待讀者，中華名菜譜特價300元，並贈送價值40元的便當快餐食譜一本，西菜西點精華特價360元
中華出版社郵撥帳號18080號