

番茄早疫病

3 早疫病

病徵：本病多發生於葉部，莖、葉柄、果梗、果實較少發生。葉部病斑初呈暗褐色水浸狀小斑點，而後擴大直徑約6~10毫米的圓形同心輪斑紋。後期葉部具許多病斑枯萎黃化，莖部也呈相似病徵但常腰折，果實受害則失去商品價值。病斑上具黑微狀物，栽培期，溫度在28—30°C時本病最易發生，尤其在多雨高溫下。

診斷：本病多在葉部發生，由老葉開始引起，病

斑為圓形或橢圓形暗褐色，其上具同心輪紋，潮濕時乃見黑微狀物。

防治法：(1)如果以往此區早疫病發生嚴重，應於移植後6星期開始定期噴藥。藥劑以猛乃浦(400倍)較好，因其防治範圍較廣，也可兼防治晚疫病及其他病害的效果。可在番茄果實豆粒大時開始撒布，而後每隔7~10天撒布一次，視陰雨或晴天而定再撒布約5次。


(2)種子溫湯處理：種子內外常附有早疫病菌，種子應先以52°C溫水浸20分鐘再行播種。

(3)田間維持清潔，氮肥不可施用太多，苗床施行消毒。


4 尻腐病

病徵：本病主為害番茄、甜辣椒、茄子果實等，最初在果實昇端呈水浸狀而後變黑斑點，病斑擴大且在果實末端腐爛，果實皺縮，果皮變黑而革質化，病斑部份後期常蓋有黑微狀物，此為後來才被感染的腐生菌。

本病為環境因子影响而引起，如果幼苗培植於涼濕苗床，並且發育很快，而後移植於沙質壤土時，本



您知道火雞要怎樣養才賺錢嗎?



請快預約訂購

火雞飼養

本書由火雞飼養育種專家台灣省畜產試驗所家禽系主任簡明龍執筆，介紹火雞品種、種火雞繁殖、種蛋孵化、飼養管理、營養及飼料、疾病防治、火雞肉營養價值、銷售方法及食譜。

插圖多，內文套色，封面彩色，24開本，全書114頁。

定價140元

優待本刊讀者，凡在70年5月15日前
匯款預約者僅收120元。(含掛號郵資)

豐年社

台北市溫州街14號 • 郵政劃撥5930號