

用）。球根要品種純正，無病蟲害痕跡者。

種植本圃整地後，依球根大小作畦。如球周6~9公分，作畦50~60公分。球周12~15公分，作畦55~60公分。球周18公分以上，作畦應為100公分。排水不良耕地作畦宜高，普通園地作平畦即可。球根的種量，以球周12公分為例，每分地（10公畝）需要15,000球左右。株間距正好12公分。也就是說，球周和株間距成正比例。

百合的需肥量，切花栽培多於球根栽培。通常的年用量是：每分地N:P:K=21:18:20公斤成分量為標準。追肥分別於2~7月間追施2~3次。

百合根羣弱，除草施肥要注意。種植地通風要良好，否則易生病蟲害。為防根部日照直射，和雜草滋生，在6~7月可行間作。間作物以大豆、花生最理想。



麝香百合（廖毅卿）

繁殖方法有：實生、分球、木子、鱗片、珠芽、挿木等，其中以鱗片繁殖最實用。球根的鱗莖從外側片片剝離，每片可繁殖成一株。鱗片繁殖生長，較之木子要慢1年，較實生早2年。用鱗片繁殖，選球要越大越有利。整個球根不分內

、外側，大、小均可供用（其他非麝香種類僅可用二分之一的外側鱗片）。

鱗片下種應將基部向下，內側向上斜挿，深以鱗片的三分之二為度。鱗片的挿植管理，和一般的挿木無異。

豐年半刊姊妹刊物
農業周刊

內容豐富，形式美觀！

● 專欄報導

農產貿易·家庭園藝
食品營養·消費安全

全年52期·訂費300元

豐年半刊長期訂戶
訂農業周刊僅收270元
，劃撥訂閱時，請註明訂戶編號。

豐年社

台北市溫州街14號·郵政劃撥5930號