

防治 敏豆 銹病 新藥劑

• 蘇明清 •

三得寧 (混合) 乳劑 (Sapxin)

西德 BASF 與 Celamerck 二廠共同研究發展的混合劑 (德信、正光公司代理)，為系統性殺菌劑，能抑制病菌孢子的發芽，亦可阻止菌絲蔓延，在防治銹病方面效果良好，具有特殊增效乳化劑，使用時不必再加展着劑，可達到濕展效果。

(1)有效成分與理化性狀：

普通名稱	劑型	有效成分	含量%	商品名稱
三得寧 (混合)	乳劑	(1)N,N'-[1,4-piperazinediyl-bis-(2,2,2-trichloroethylidene)]-bis-formamide.....14% (2)N-Tridecyl-2,6-dimethyl-morpholine.....16%	30	Sapxin

成品農藥係三得芬與賽福寧二種有效成分混合，該兩種有效成分的單劑國內已使用多年。

(2)使用方法及範圍：

使用方法		使用範圍	注意事項
每公頃 每次用藥量	稀釋倍數	敏豆銹病	1.發病初期開始施藥，每隔10天噴藥1次。 2.採收前4天停止用藥。
1.0~1.5公升	1,000		

(3)毒性：該混合劑急性經口毒性LD50對鼠3,650毫克/公斤。



敏豆採收



敏豆

