

風倒枇杷扶正

● (1)枇杷樹已4年生，去年被颶風吹倒，可否再扶正？會否影响生長？

(2)晚熟種蓮霧可否高接早熟品種改良？應在何時高接？(宜蘭縣礁溪鎮玉田村21號藍炎樹)

● (1)枇杷樹被颶風吹倒後，應立即扶正，立支柱、培土，影响生長不大。如果吹倒後經數月，不宜過於勉強扶正，將來可利用彎曲部所生長直立枝，再行整枝工作。

一般在扶正後，可酌剪去部分地上部位枝葉，以利樹體成活及工作方便。(范念慈)

(2)蓮霧晚熟品種可採用高接方法更新早熟品種，成活率甚高。

高接時期，3~11月均可，其中以3~4月及9~11月為適。(王德男)

香菇太空包

● (1)香菇太空包栽培能否與木耳或平菇一樣排列？

(2)香菇太空包接種後多久才會發菇？

(3)當香菇開始發育時，塑膠袋須除去 $\frac{1}{3}$ ，或應全部去除？

(4)聽說香菇生長期間，太空包須時常移動，其意義為何？(彰化縣田中鎮沙崙里中州路2段914號張良賜)

● (1)香菇太空包因濕度不易保持，較不適合像木耳或平菇一樣排列上架。

(2)香菇太空包接種後4個月至4個半月，即可洒水及震動促使發菇。

(3)塑膠袋去除 $\frac{1}{3}$ 較適合，若全部去除濕度及水份不易保持而且易生雜菌。

(4)香菇太空包生長期間，放至完全長滿準備出菇時加以震動有助於實體的形成，其原因未明，有人說是可使菌絲震斷而加速組合形成小菇蕾，但沒有學理根據。(廖英明)

聖心芒果

● (1)我已經種植2甲地的愛文芒果，想要再種植2甲地的聖心品種，是否可以？

(2)產量如何？會否隔年結果？

(3)種植5年後，每株年產量如何？(台南縣柳營鄉篤農村338號連進興)

● (1)既有種植愛文芒果的經驗，再要種植聖心芒果，技術內行，當然可以成功。但不可在同一果園間作，應該另闢園地種植。聖心為中晚熟種，成熟期接續愛文之後。

(2)聖心着果力強，產量高。年年充分施肥就不會隔年結果。

(3)定植後5年每株產量25~40公斤。(曾錫恩)

種兔飼養

● (1)時下台灣飼養的種兔共有幾種？

(2)為何每隻種兔須隔間飼養？

(3)雄、雌兔每年最大極限可交

配幾次？雌兔自生產日起計算，需隔多長時間，始可重新交配？

(4)如何鑑別雌兔的發情期？

(5)以何種飼料飼養最適宜？(嘉義縣民雄鄉寮頂村民權路40~26號劉山棟)

● (1)本省兔種有安哥拉毛兔、湖西蘭白兔、日本白兔、英倫黑耳兔、青翠拉等，但進口時間已久，有的淘汰、雜交，現品種已雜。以帶有雜交品種繁殖較佳，目前業者所養大部為純白毛皮、肉兼用種。

(2)種兔隔間飼養，在雌兔方面，可防互鬥咬傷，配種容易管理。雌兔由於分娩、育兒，要避免刺激以調劑飼養較佳。

(3)雌兔自然交配次數，以每隔3~4天配種1頭(2次)，雌兔具年產5~6胎為原則。雖然母兔生產3天後有配種懷孕的記錄，但必須給母兔有段恢復期，應隔28~35天再配種較適宜，可延長母兔使用年限。

(4)母兔發情週期3~12天，平均7天，發情時外陰部稍腫脹充血成紫紅色，舉動活潑，前肢抓褥草，後肢有敲打現象，接近不表厭惡，眼中晶瑩發光，被毛有光澤或有自咬腹毛作營巢狀。

(5)飼料以粒狀飼料，含粗蛋白16%以上，但必須補充牧草，提高粗纖維的獲取。(李茂盛)

