



管理良好的筍園

量追肥，及注意病虫害的防治等。

(6) 掘苗移栽，當株苗生長高度超出75公分、每苗貯藏根在12條以上時，即可挖苗，挖苗前應該先將定植田間整地等一切工作準備好，在挖苗當天栽種完畢

因為蘆筍苗挖出以後，受日光曝曬被風吹乾，不僅定值後降低了成活率，並且影響初期的產量，因此必須防止乾燥，把握時間，縮短挖苗到栽種的時間。

3. 育成自己的優良品種：根據試驗調查結果，省產品種比任何外國進口品種，較不易引起缺株。育成自己的優良品種的重要性，非三言兩語所能道盡，總之，我們如要在國際市場爭一席之地，這種工作是刻不容緩的。

4. 定植前應勵行土壤消毒：缺株的主要導因，為根腐病所造成，而根腐病病原主要是由土壤傳播，所以在定植前應勵行土壤消毒，但目前尚無適當的藥劑是絕對有效的。依據高雄區農業改良場“蘆筍更新客土試驗”結果，客土雖可減少根腐病原菌的含量，但後期仍有逐漸升高的趨勢，如配合火燒土壤消毒，效果甚佳。

施行方法：在定植前，先犁好定植溝30公分，然後全面平鋪稻草放火燃燒，可達全面消滅效果。俟土壤冷卻後可施堆肥、化學肥料，草木灰及客土的混合物覆到地表下面下6公分，然後進行定植。

5. 定植切忌太深：蘆筍的地下莖是縱列狀互相密接，繼續發生的莖基部累積而構成的。生長有一定的方向，並隨年代逐漸長大，因此如不培土，則根盤有裸露的情形。一般筍農為節省運送客土的麻煩，均採用深植，深植不僅容易使幼芽窒息枯死，而且在雨季

如果排水不良，地下莖及貯藏根易生病腐敗。

6. 妥善管理增強生長勢：本省蘆筍栽培，採用留母莖採收栽培法，故應趁早設支柱，拉鐵線扶持莖枝。蘆筍地下莖，有在地下15公分水平生長的習性，因培土15公分，莖容易倒伏，培土過厚徒促地下莖上升，應趁早設支柱，拉鐵線，支持莖枝促進生長。

為灌溉及排水需要，栽植後作成畦溝，必須在兩期前完成。定植後1個月施追肥，每10公畝施硫酸銨4公斤，氯化鉀2.5公斤，於灌溉後施肥，以提高肥效。以後看生長情形酌量追肥。

7. 注意病虫害防治：本省蘆筍栽培方式，採用留母莖採收法，一年四季田間生長莖葉，採收期高溫多濕，易罹病虫害，使地上部失去正常功能，影響生育、產量、品質等。所以筍園必須把握時機清園、杜絕病原菌，將園內雜物能燒燬最好，以杜絕病源。並勵行綜合共同防治增加防治效果。

農林廳訂定

外銷白蘆筍母莖休閒期

希望筍農加強筍園管理

省農林廳表示，70年度外銷白蘆筍原料生產母莖休閒期間，經訂自6月16日起至7月25日止，並自7月26日開始第二期檢收工作。盼望有關農會及農民應加強筍園肥培管理，以及病虫害防治工作，以提高原料品質。同時請工廠在此期間不得收購原料產製，以確保產品良好品質。

農林廳說：70年度上半年外銷白蘆筍原料檢收，由於梅雨影響，筍徑變細，斷筍甚多，品質不良，經台灣省農會於6月上旬請有關專家前往產地調查結果，蘆筍母莖已大部份枯黃，亟需更換休閒，以健壯筍株。並召開各級有關農會會議討論結果：訂自6月16日起至7月25日止為蘆筍母莖休閒期間。

並經提報特產原料發展小組通過，轉知會員工廠配合有關農會辦理，在母莖休閒期間不得檢收原料產製，同時建議工業局在休閒期間，邀請有關單位前往各工廠抽查。

又由於本年上半年度雨量較多，蘆筍莖枯病可能較為嚴重，各地農友應加強病害防治工作。