

玉米在颱風前，應修通排水溝，以利排水。如已達乳熟期者，可收穫供作生食用，如已達完熟期者，可提早收穫。再培土1次，以防倒伏。已收穫的玉米穗，應堆置高處，以防風吹水浸。

颱風過後，應排除積水，並注意病蟲害的防治。生長期的植株，應施用少量追肥，以恢復生長。斜倒的植株應扶直，已收穫的玉米，應立即曝曬，以防發酵變質。

甘蔗

甘蔗在颱風前，應提前培土和整理排水溝，原料蔗園提前剝葉，並盡可能搭竹架支柱。

颱風後，應清理蔗園，立即排除積水。折損的蔗莖，採取做為蔗苗。倒伏者扶直後，施肥培土，以促進生長。

香蕉



——果實近熟者剪除部分青葉——

香蕉在颱風前，應多留1、2株較小的萌芽，以便接替主株。架立支柱，起碼每株1柱，最好採用防腐支柱，並分3段，將植株縛在支柱上。避免除草，以免因土壤弄鬆易倒伏。割除枯葉，減少植株的

重量。如植株上果實熟度已高，半個月內可採收者，可將青葉剪除或折彎一部分，以減少倒伏。

颱風過後，如果僅是葉片被吹成絲狀，以後還是能結果的植株，仍須疏果。如果植株已折斷或倒伏，應該砍掉，以促進萌芽的發育。

葉片吹裂，且假莖沒有折斷的植株，果實仍能成熟，但應看實際情形，疏果1~3段。植株彎折，中心果軸沒有折斷，而果實達3~4分熟的，也要疏果2~3段，並用支柱支撐已傾斜的果實。

植株如傾斜，應速用竹竿支柱，以免下雨後全株倒伏，並視情形疏果與覆蓋果實。

植株折彎而不完全折斷，未開花結果者，可在災後2~3日內，將植株扶直，折彎處兩邊用支柱2支，並用塑膠帶縛緊，使新葉仍由頂端生長而開花結果。並應注意施肥管理和病蟲害防治。

台灣省農林廳肥料登記證農肥字第0166號

註冊 商標



日本進口
土壤改良劑
(含多量微量元素)

醫壤素

效能：消除連作障害、根腐病、公害、水質污染、改善地力、補充微量元素、延長鮮花壽命、大幅增加番茄、瓜類、果類、水稻、菸葉茶葉收成並提高品質。

台灣總代理：豐收興業股份有限公司
公司：嘉義市延平街三八八號 電話：(052) 273802

文獻及改良場試驗報告備索

徵求全省各地經銷商 郵政信箱：嘉義136號