

# 可伐鼠溶液 · 丁拉汰草粒劑 蘇明清

## 可伐鼠溶液 (Chlorophacinon)

法國Lipha-Lyon產品 (嘉寶公司代理)，可供殺鼠毒餌之用。


(1)有效成分與理化性狀：

普通名稱	劑型	有效成分	含量%	商品名稱
可伐鼠	溶液	[ (chloro 4 phenyl) 1 phenyl ] ac-ethyl 2 dioxo 1-3 indane	0.25	Liphadione

有效成分為黃色結晶，熔點140°C，可溶於多種有機溶媒，難溶於水。

(2)使用方法及範圍

使用方法	使用範圍	注意事項
每公頃的毒餌用量：約4公斤	野鼠防治	一、毒餌製法：使用本藥劑一份，糙米50份及花生油少許，混合均勻，調配成0.005%的粒狀毒餌，依需要量裝於塑膠袋內。 二、每公頃設置50個毒餌站，每站一次餵粒於毒餌50—100公克。 三、人如誤食中毒應即送醫急救，並用維他命K為解毒劑。




(3)毒性：急性經口毒性LD<sub>50</sub> 15毫克/公斤。

## 丁拉汰草 (混合) 粒劑

興農化工公司研究發展的混合劑，原配方丁基拉草3%提高為5%，可防除螢蘭等雜草。

(1)有效成分與理化性狀：

普通名稱	劑型	有效成分	含量%
丁拉汰草 (混合)	粒劑	(1)N-(αα, -Dimethylbenzyl) -N-P-tolyl urea ..... 3% (2) 2-chloro-2,6-diethyl-N-butoxymethylacetanilide ..... 5%	8



成品農藥係丁基拉草與 Dimuron 的混合劑，丁基拉草5%單劑 (粒劑) 係國內使用最普遍的殺草劑，另一有效成分 Dimuron 為無色針狀結晶，熔點203°C，難溶於水，可溶於多種有機溶媒。

(2)使用方法及範圍：

使用方法	使用範圍	注意事項
每公頃每次用藥量 30公斤	水田雜草、水稗、鴨舌草、球花高草、母草、紅骨草、牛鬍毛、螢蘭	1.施藥時期：田面雜草生長狀態剛萌芽1葉時。插秧後數日第1期作2—4日；第2期作1—3日。 2.積水時期：3—5日。



(3)毒性：急性經口毒性LD<sub>50</sub> 5,000毫克/公斤。