

果美生長素溶液 · 磷化鎂燻蒸片劑

果美生長素溶液 (Fruitone CPA)


美國 Union Carbide Agricultural Products 公司產品 (台灣永備公司代理)，在美國係供為鳳梨生長調節試驗專用。

(1)有效成分與理化性狀：

普通名稱	劑型	有效成分	含量%	商品名稱
果美生長素	溶液	Sodium 2 - (3-chlorophenoxy) propionate	8	Fruitone CPA

(2)使用方法及範圍：

使用方法	使用範圍	注意事項
稀釋倍數		
4,000—5,000	鳳梨的延熟及增產	1.果實成熟2—6星期前將藥劑均勻噴射於果面，每顆20公撮。 2.使用時期過早或濃度過高時可抑制吸芽發生及裔芽發育。



磷化鎂燻蒸片劑 (Phostox in-Plates, Fumi-Cel)

西德 Degesch GMBH 廠產品 (吉鳳行代理)，板狀片劑，可供倉儲燻蒸處理。


(1)有效成分與理化性狀：

普通名稱	劑型	有效成分	含量%	商品名稱
磷化鎂	片劑	Magnesium phosphioe	32	phostoxin-plates (Fumi-Cel)

農藥原體成分為磷化鎂 (Mg_3P_2)，產生作用係以磷化氫 (PH_3) 氣體狀態達到殺虫效果。

(2)使用方法及範圍：

使用方法	使用範圍	注意事項
倉容每72立方尺使用藥劑1板 (約200公克)	於草倉庫甲蟲	1.燻蒸方法：密閉燻蒸3日~5日。 2.撕去藥板外的鋁箔，即投入燻蒸室。
袋裝穀物每30—67立方公尺使用藥劑1板 (約200公克)	積穀害虫	該板劑約200公克，於袋裝穀物每30—67立方尺使用1板，密閉燻蒸，但必須技術人員指導才能使用。



(3)毒性：急性經呼吸毒性 LD_{50} 25ppm (0.035 公克/公尺³)，屬劇毒農藥，使用時應注意防範。