

農藥使用技術指導專欄



作物的病害圖鑑，或請專家鑑定由何種病菌引起後，再選用藥劑噴撒。

線蟲引起者在本省以根瘤線蟲較多，此類線蟲多在根部引起瘤狀物，植株矮化或呈生長不良狀，可選用殺線蟲治療。

另外由病毒引起的徵狀，最常見者為葉部呈嵌紋狀，葉片上有些部份較淺綠，有些部份則濃綠，濃淺綠相間構成嵌紋，葉子常變小，並呈皺縮狀，這都是病毒引起者。有時所有葉片黃化，或有淺綠條紋，果實結實不良。

病毒引起的病變，目前尚無藥劑可防治，藥房若

有防治病毒的藥劑出售，目前均無效，農友不可相信。防治方法只有在早期發現時，將病株儘早拔除燒毀；或在早期發生時，請專家鑑定由何種病毒引起，並請教此種病毒的傳染媒介昆蟲為何，再選用此昆蟲的殺蟲劑及早噴撒，尚可抑制本病的蔓延，否則俟病毒普遍在田間發生時，則為時已晚，不必再浪費金錢購買藥劑噴撒了。

紅蜘蛛引起者較易辨認，在病斑上許多紅色小點狀物聚集在一起，以放大鏡觀看，則見有八隻腳蜘蛛狀小動物蠕動，此即為蟎類，可選用殺蟎劑噴撒。

(全文完)

台灣省農林廳肥料登記證農肥字第0166號

註冊 商標



日本進口
土壤改良劑
(含多量微量要素)

醫壤素

效能：消除連作障害、根腐病、公害、水質污染、改善地力、補充微量要素、延長鮮花壽命、大幅增加番茄、瓜類、果類、水稻、菸葉茶葉收成並提高品質。

台灣總代理：**豐收興業股份有限公司**
公司：嘉義市延平街三八八號 電話：(052) 273802

徵求：業務專員數名，高農以上役畢
徵求全省各地經銷商 郵政信箱：嘉義136號

文獻及改良場試驗報告備索