

(2)露天式堆肥舍最好是挖土坑並敷上塑膠布，以防肥份滲漏，大小可依你收集的的果菜葉而定，最好上面也蓋1層塑膠布，一來防止氮素揮散，二來可促進堆肥腐熟。如果1公頃施用腐熟堆肥20噸，化學肥料氮肥可減3成，磷、鉀肥約2成。一般腐熟堆肥不會增加病虫害的發生。(黃和炎)

## 百合花期調節

- (1)如何栽培，才可使麝香百合的花期錯開？
- (2)以在市場上的銷售而言，花朵數以幾朵最適宜？
- (3)按照目前供銷情形，是否值得擴大栽培？
- (4)是否有介紹百合、劍蘭、夜來香等球根花卉栽培法的書籍？(雲林縣大埤鄉三結村頂埤頭3號徐安俊)

(1)百合在台灣，一般均在4月間開花。若要提早或延遲開花，要在開花前1年內，對球根貯藏及種植期作不同處置。

①4月開花的，球根是在常溫貯藏，前1年9~10月種下。

②延遲於4月以後開花的，在前1年11或12月種下。

③欲在4月以前開花，須於前1年6月收起球根後，放在低溫下(2°~4°C)貯藏，至少1個月，至9、10月再種下，則在12月至1、2月間可以開花。但冷藏期越久，對花莖及花朵數的影響越大，即花莖變短，花朵變少，且可能有畸形花出現。

(2)以花朵數目而言，不論在插花或盆花，都以5至7、8朵較宜，1、2朵太少，10朵以上太多，花朵數依球根大小而定，種後營養亦有關係。

(3)本省對百合的愛好者不多，銷路有限，不宜擴大栽培。

(4)請參看本社出版的「台灣農家要覽」。(彭昌祐)

## 小 啓

最近接到許多農友來信，詢問淡水肉螺是否值得飼養？會不會取代蝸牛的地位？有關這些問題，請參閱本社出版的農業周刊第321期第18、19頁。



農林廳肥料登記農肥字第0149號 已列內銷檢驗第302014號

濃縮液體有機肥料

日本最新進口

# 特奇液 タキイ


日本タキイ(TAKII)種苗株式會社榮譽出品

保證功效：

\*PH中性 \*促進發芽 \*提早收成 \*提高品質  
\*增加收成 \*防止霉害 \*改善土質 \*無害連作

獨特成分：

\*高氮、磷、鉀微生物質 \*含有核酸、亞米諾酸、植物的高級成份。  
\*完全含有有機質成份。



現貨供應

總經理

野生企業有限公司

電話(033)323339·374004~6

## 為您服務是我們的榮耀

更為您建立無形的財富

與安全的屏障

本行不惜鉅資培育優良造林種苗如楓香、黑松、薩爾瓦多銀合歡...也儲備優秀育林技術人員誠懇的為閣下服務—及庭園用種苗繁多不及備載。

歡迎參觀

批評指教



梅園園藝企業行

TEL:(039)565808

地址：宜蘭縣羅東鎮公正路156號  
關係企業：原野造景企業有限公司