



小白紋毒蛾

花穗、果粒、穗梗、枝條等部位。

防治方法：目前尚無推廣藥劑防治此虫。但可參照黃毒蛾防治。

## 金龜子類

為害情形：已知者有長金龜、台灣青銅金龜、赤脚金龜、琉球條金龜、紅腹金龜、白點花金龜、樺氏花金龜。幼虫取食植物根部，汁液或腐植質，成虫取食植物葉子或花果等。

年發生1世代，以2、3齡在土中越冬，4、5月間羽化，4~5月成虫羽化開始為害，嚼食葉片使成網狀，也加害新梢幼果及成果。

防治方法：1.葡萄收穫後，清理果園，勿使落葉覆蓋地面，以阻止成虫產卵。

2.避免設置堆肥場所於葡萄園附近，以免成為幼虫的溫床。

3.白天捕捉成虫，夜間則以燈光誘殺。

4.早期覆蓋紗罩於葡萄穗上，以防害虫取食。

5.目前尚無推廣藥劑防治。

## 介殼虫類

為害情形：葡萄的介殼為圓介

殼虫及粉介殼虫，種類甚多，加害新梢葉柄、果穗、枝條、樹幹等部位吸食汁液使樹勢衰弱，甚至分泌蜜露誘發煤病。

防治方法：在休眠期以95%夏油乳劑50倍加44%大滅松 1,000倍或95%夏油乳劑50倍加50%加保利可濕性粉劑 500倍防治1次。生育期間以40%大滅松乳劑 1,000倍防治，但有果實時限單獨使用以免生藥害。

## 台灣白蟻

為害情形：此虫常年可見，有翅成虫於4~10月間出現。若虫發育後即行取食、造巢等破壞行為。白蟻可在莖莖表面覆蓋一層泥土，可向上延伸，覆土部位即其為害處及其通行隧道。莖莖上枝幹脫落的遺痕也常為白蟻所入侵、蛀食。影响葡萄輕者不開花結果，嚴重者整枝死亡。

防治方法：1.當冬季修剪枝條時檢視植株，如被害時對枝條表面覆土剝落，並翻掘近根部之土壤，破壞蟻穴擒殺蟻后。

2.灌溉便利時，將葡萄園浸水一段時間，以淹斃之。

3.鋤草時勵行深耕，以破壞蟻穴。

(未完·下期續)



黃毒蛾




## 立花菌新農法

# 立花菌

(微生物酵素劑)

能培養於磷肥及鉀肥中  
自動控制N(氮肥)的吸收  
使P(磷肥)完全發揮效果

### 磷酸的吸收



### 無農藥栽培

高品質、甘味、大豐收

製造發売元

立花菌有限公司

技術合作

日本橋微生物利用研究所

北部連絡處：三信行

陳耀宗

宜蘭縣礁溪鄉龍潭村大坡路25-13號

TEL:039-332552

● 詳細資料備索