

軟多汁，果皮光滑，甜味可口，糖度高。

栽培管理

栽培適期：落葉休眠期間（11~12月）種植最適宜，苗株尚未萌芽前種植。

株行距：仍照一般果樹栽培原則，瘠地可用4×4公尺。

種植方法：仍同果樹栽培法，種後灌溉，支撑，覆蓋。

樹勢養成：冬末種植，早春萌芽，生長快速，必須注意樹勢的養成。摘取無用側枝、下垂枝、徒長枝、陰枝，控制有效主枝，分成適當側枝及亞側枝等作業，需在春夏生長茂盛期完成。

應注意病虫害的防治工作。營養份補給也重要。對水分的感應，或碳水化物及無機養分過多與不足極為敏銳。

油桃為落葉性，在生長期間，必須適量的養分。氮素的施用更為重要，如果氮素施用過量，則枝梢過度伸長。在同一時期，更不可任枝條伸長停止，如果養分的爭奪延至晚期，會造成秋冬落葉不正常，延誤休眠期間。

生育期間：油桃在6~7月間行花芽分化，在此生月中，枝葉的細胞活動勿使折損。必須注意葉部完整，勿使害蟲食為害殘缺。徒長枝應注意抑制，保全萼片潛育花芽苞，到落葉期為止，概已形成完畢。在落葉後的冬季，花芽發育仍進行至12月間。

剪定施肥：冬季剪定為整理樹形、調節樹勢及結果量。剪定技術視樹勢而定，自難判定強弱。在短梢剪定樹冠形成期，僅對於主枝尖端行長梢剪定，其他部份，均行短梢剪定，此剪定對樹齡差異頗大。對其樹體內的營養即碳水化物與氮素的比率影響，直接與營養及生殖兩作用有關係。

如主枝的尖端相重，因樹勢旺盛而反覆強剪，則必影響營養生長，引起落葉，招致結果不良，所以在剪後必須注意營養分的補充，應施入有機質肥料（遲效肥料），使其保持樹勢，維護營養分消耗，以供來年穩定開花結果。

油桃目前一般均採用嫁接苗木，定植後2~3年的樹勢養成後，即可結果生產。通常在早春（2~3月）開花，要做好誘導授粉。花謝結小果後約30天即行套袋作業，75天即可採收。如貯於低溫之處，可貯存1週，熟後美味可口。

農業知識的寶庫・豐年叢書

書名	定價 (元)	書名	定價 (元)
台灣觀賞植物集	(精) 300	專業栽培蔬菜30種(增訂三版)	(平) 140
台灣的蝴蝶	(精) 250 (平) 220	經濟果樹(上)	(精) 230
台灣的海水觀賞魚	(精) 300	經濟果樹(下)*上、下冊合購 僅收430元	(精) 250
台灣鄉土引	(平) 100	觀賞植物(增訂再版)	(平) 80
台灣的野生蘭(增訂再版)	(精) 180 (平) 150	九重葛盆景藝術	(平) 40
瓜類栽培(增訂再版)	(平) 100	水產養殖(增訂再版)	(平) 150
莖菜栽培	(平) 120	肉飼飼養	(平) 65
豆類蔬菜	(精) 150 (平) 120	家畜家禽衛生(增訂六版)	(精) 160

豐年社

台北市溫州街14號
郵政劃撥5930號

*國內郵購每次請另加掛號郵資9元。

*國外郵購請先通知書名及數量以便報價。