



### 麥片養魚

- (1) 用麥片飼養吳郭魚，為何效果不很好？
- (2) 在3月份飼養16隻金寶螺，今流放於魚池已繁殖上萬隻成螺。請問此螺經濟效益如何？市場銷售是否樂觀？（台南縣後壁鄉嘉民村128號賴盤銘）
- (1) 養魚只用單一飼料時效果較差，何況麥片的粗蛋白含量僅11.24%，粗纖維高，生麥片消化率只有50%，效果更不好。鹿港水試分所過去試驗，3公斤麥片可長成1公斤吳郭魚。
- 目前頗多養殖業者採用人工完全飼料，即吳郭魚粒狀飼料。

(2) 請參閱本社出版的「農業周刊」326期第2頁。（余廷基）

### 鹿胃病治療

- (1) 鹿（梅花鹿、水鹿）的第1胃食滯與急性鼓脹病的症狀，用肉眼觀察有何差別？
- (2) 應如何治療？（台南縣安定鄉保西村434~1號王明陽）
- (1) 第1胃食滯（擴張）是，第1胃充滿多量乾燥之飼料（食物）擴大緊張。急性鼓脹是第1胃及第2胃急劇釀生多量氣體。當然第1胃食滯有時也可轉變為急性鼓脹症，一般以牛發生最多，羊鹿較少發生。

以肉眼觀察最大的症狀不同點為，第1胃食滯胃內容物充滿，觸診或叩診上可知發出濁音。急性鼓脹胃內容物為氣體，在叩診上可發出鼓音，且呼吸高度促迫，開張前肢，重症者數小時內可致死。

(2)a. 第1胃食滯的治療法：

① 應先作絕食或減食1~2月，絕對禁避粗飼料

，裝口網以防採食臥草。

② 用兩掌在左脇部由後下向前上按摩10~30分鐘，每日2~3次，重者由2人左右同時按摩，但孕畜右側不宜施行。

③ 索運動，若在站立時應使前軀高、後軀低的姿勢為佳。

④ 藥物治療方面，應內服健胃劑、驅風劑、下劑及蠕動催進劑等。

⑤ 重症而昏迷者可用20%葡萄糖酸鈣靜脈注射甚有效。

⑥ 第1胃切開術，為緊急處置及食滯甚硬固，前述諸法無效時應施行手術。

⑦ 利用針灸法亦可奏良效。

b. 急性鼓脹症的治療法：

① 高舉前軀，按摩兩側脇部，或驅逐病畜上坡路，或脇部灌注冷水。

② 為催進暖氣及嘔吐，可將舌引出口外，上下運動。塗煤油於口內，或以小枝纏麻布刺激軟腭及咽門。

③ 急救目的可反復施行穿胃術放氣，但不可急放，應慢慢放氣。

④ 利用次亞硫酸鈉、稀鹽酸或鉍心等制酵驅風劑內服，若嚙下有困難時，可利用胃導管注入胃內，或於穿胃時注入。

⑤ 利用抗泡劑（清潔劑、花生油、豆油等）內服，或灌入胃內以防發酵脹氣。

⑥ 利用前肢蹄冠部血管針灸術亦有良效。

⑦ 護理方面，急性危險症狀消退後，猶須注意飼養，以防再發。以絕食或減食，勿給青草而給一些健胃劑或下劑。牧地豆科植物不宜超過50%。放牧以前給乾草一些也有預防效果。（李永基）



## 共同出資購地

### 法律問題解答

## 不應一人登記

台東縣長濱鄉城子埔28鄰1之2號  
李高銀先生問：

我有1友人余紹貴在62年12月1日與苗玉、任全才等2人共同出資購買水田乙筆約9分餘。當時3人均在買賣契約書上蓋章，於送件登記時，僅以任全才1人為所有人。任全才於去年冬死亡且無繼承人，請問：

- (1)余、苗2人如何才能取得土地之應得持分？
- (2)是否可以當時出資額之 $\frac{1}{3}$ 作為死後葬喪費？

高瑞錚律師答覆：

(1)物權壹以登記為準。所指水田既登記為任全才1人所有，法律上將僅承認任君為所有人。雖然，余紹貴、苗玉2人曾經共同出資各 $\frac{1}{3}$ ，但充其量僅對已故任君具有債權請求而已，在法律上的地位

顯得非常薄弱。

如余、苗2人能舉證證明，當初登記任全才名義是一種信託關係，余、苗2人原可為終止信託的意思表示，請各移轉登記 $\frac{1}{3}$ 。但依照62年9月3日公布施行之農業發展條例第22條的規定，耕地已不得移轉為共有，所以余、苗2人亦無法為此一請求。

因此，余、苗2人應依非訟事件法第78條，以利害關係人的身份，聲請法院裁定指定任君的遺產管理人。然後，以遺產管理人為被告，請求清償債權。遺產管理人應就處分所指田地所得償付余、苗2人。

(2)至於葬喪費用如余、苗2人曾代墊支者，亦得檢據核實請求一併償還。

## 芋採收期

(1)從豐年叢書「瓜類栽培」發現，南瓜周年都可栽培，以11月~2月為播種適期。如果7月份要種可不可以？以那一種比較好？

(2)芋頭是否要施有機質肥料？為什麼莖很粗大而根却很小？（桃園縣楊梅鎮大成市場44號林盛祥）

(1)7月份種南瓜，以木瓜型南瓜為適。

(2)一般來說，有機質肥料及化學肥料都宜酌量施用。詳見本社出版的「專業栽培蔬菜30種」。

至於芋莖很粗而芋頭很小，可能是還沒有到採收期，球莖尚未長大。請待由葉柄集合成的假莖稍為萎縮後再收穫，芋頭就會肥大。（郁宗雄）


## 仿土雞飼養

我家門庭前面，有塊土地將近半分多，想養「土仔雞」做為副業，請問：

(1)這塊土地大概可飼養多少？

(2)其抵抗力是否較強？是否仍需預防注射？

(3)小雞、中雞、大雞每個時期需多久？（高雄縣



大寮鄉大寮村122號陳有銘)

(1)半分多地約有150坪，加以120坪養仿土雞，每坪養25隻，約可養3,000隻。每坪飼養數目越少生長會越好。

(2)仿土雞對疾病抵抗力雖較強，但仍需做預防注射。

(3)仿土雞約養15周左右即可出售，很難分出小、中、大雞階段。如一定要分，以1~6周為小雞，7~12周為中雞，13~15周為大雞。

白色肉雞通常分前期（1~4周）及後期（5~8周），並給不同飼料。仿土雞也一樣，有人分前後兩期，但也有人分3期，並給不同飼料。（簡明龍）