


外國鹿的品種



紅鹿

姚守成

台灣原有的野生鹿有台灣水鹿及台灣梅花鹿兩種，在國際鹿種的分類上，已自成品系。可惜台灣地狹人多，野生動物生存不易，這兩種鹿已捕捉殆盡，而多年圈飼者，原始野性喪失，品種日益衰退。因此養鹿業者近年來紛紛探尋新種，並不斷自國外引進新種。茲將已進口及可能進口的鹿種，介紹牠們性能及分析優劣如下：

印第安花鹿

印第安花鹿，英名 Indian Axis，毛赤褐色，有白點，毛色光亮，冬夏不換毛，肩高3~4呎，身長5呎，體重150~250磅，腿的下段白色，角向後，約3呎長，前2叉向前而叉向上。茸形圓，至4歲時，約50~60兩。脫角、交配及受孕、產期，遲早無定期且常有1胎2~3頭。此點與其他鹿種特別不同。

本鹿生長於暖熱地區，如在過寒地區，而無保溫設施，不易生存，尤其是幼小鹿。印第安花鹿與台灣梅花鹿，極易混淆，茲將兩者的區別說明如下：

(一)品類不同——台灣梅花鹿，一名山鹿，又稱台灣鹿，英名Formosan Sika Deer，學名Cervus taionanus Blyth，另有異地同種一種，名叫日本花鹿，英名Japanese Deer，學名Cervus nippon Temminck，以上數種，一般簡稱Sika Deer。

(二)體形不同——Sika 主要不同在體型及體重較小，以台灣的飼育目標而言，因茸小，所以缺少經濟價值。飼養者多取其鞭。此鹿圈飼歷史較短，尚具原始野性，性慾特強，1公可交配20母，大家認為深具藥效，價奇昂。毛色夏天棕褐，冬天淡褐，臀部白色，角前傾，前方2叉自基部向前直伸。茸小，體型輕，秋季交配，懷孕230~250天，春末分娩。

(三)國際上的價位不同——目前台灣與韓國四出搜尋新種，均重印第安花鹿而輕梅花鹿、日本鹿。但在產鹿當地，原對鹿茸生產並無興趣。例如美國，鹿產豐富，飼養鹿的目的僅在觀賞及獵殺食肉，但在買賣交換的價值，Axis遠在Sika之上。


美國黇鹿

美國黇鹿，英名 Fallow Deer，毛色有3種，以純白色者最多，次為淡褐色有白點，但冬季換成無白點的灰褐色，並有抗寒的厚實絨毛。再次為黑色者，體型大小與 Axis 相仿，肩3~4呎，體長4~5呎，重150~220磅，盛產於北美。

近年鹿商曾集中採運到台灣，為目前引進品種中唯一成功者。黇鹿的角冬天脫落，春天萌長，重量於4歲時，恒達50~60兩，可惜角端猶如麋鹿，呈掌狀展開，為市場所排斥。

性能方面，純屬野性，在美國鹿場雖馴飼多年，但因場地廣達百頃，無碍野性，雖轉至台灣，不耐圈飼，且食物單調，常有各種營養失調的病態，深盼飼養者注意食料變化，及儘可能任其吸收空氣陽光，以維持體健。

台灣飼養者所煩困之處，一在毛色奇特，二在角形奇特（4歲以上，扁形更加顯著，切片易呈方形）在台灣可能盛極而衰。



黇鹿

印第安花鹿

黇鹿（褐毛者）與印第安花鹿的外形，亦易混淆，但鑑別容易，簡述如下：

(一)品類不同——俗名與學名，極不相同。

(二)體形不同——冬季時，黇鹿換厚絨褐灰色毛，夏季則褐色較淡；印第安花鹿則呈光滑的赤褐色，白點明顯。至於角形不同，已如上述。

(三)國際的價位不同——除茸產不同外，美國純以觀賞目標所訂的價位，亦大有懸殊。

紅鹿

紅鹿英名 Red Deer，學名Cervus elaphus L.

，原產歐亞北部、克里米亞、高加索等地，毛色夏日赤褐，冬日則帶灰色，肩高4呎，身長7呎，重量有250~400磅（歐產者較小，肩只2呎餘）角長3呎餘，重量70~80兩，圓形。春初脫角，夏末重萌，8~9月交配，懷孕8個月，春夏之交生產。

此鹿體形為中型，茸質相傳頗優，原為飼育良種，可惜個性不易適應環境的變遷，尤不耐籠閉遠運。台灣引進國外新品種的歷史，遠可溯及8、9年前，自紐西蘭進口紅鹿，但途中死亡大半，飼育不久，又死泰半，剩餘無幾。幸賴業者苦心維持，尚餘若干，可謂頑果僅存。

又紐澳與台灣的交通頗有問題，船運必經東南亞疫區，依規定不能進口；飛機班次，從無直達，包機又因量大，風險過大。所以必須在當地圈飼多年，可免途中風險。至於二地氣候條件，亦宜細心研究或許可藉以改進今後台灣鹿種。


紅鹿體形優美，肉質鬆軟如綿羊，傳統視為上品，國際價位頗高。

馬 鹿

馬鹿英名 Elk，學名 *Cervus canadensis* Enxlichen，俗稱阿爾泰鹿、大角鹿。在我國北方，常利用牠的獸力工作，又分為黃臀、天山、鮮卑、大夏等4種。毛色夏天黑褐，冬天棕褐，四肢下段白色，胸有長毛。

此為一種次大型的鹿，美國頗多，但隨地形的南北緯度，分為北部洛磯山一帶，體形常達1千磅以上。中部米蘇里一帶則體重降為7百磅上下。德州南部一帶，固已習慣於炎熱氣候，但體重只有400~500磅左右。

鹿角冬天脫落，春天萌長，呈圓形，偶有茸端扁平者，略呈內彎，二角寬距6呎，重量恒達10~20磅。此種鹿，以產茸壯大量特重出名。茸有粗毛被覆。韓國人認為此種鹿茸，是至高上品，單就茸量而論，亦極富經濟價值。筆者深信此種鹿類，近雖無人注意，漸次必有人引進。



馬鹿與麋鹿的分別：麋鹿（英名 Moose，學名 *Aalses cawelaides*），又稱駝鹿、麋鹿。毛色夏天黑色，冬天棕褐，下肢白色，體呈巨型，肩高7呎，長9呎，重達1,200~1,400磅。頭長頸短，頸下有肉垂，長唇，高肩，長尾，角呈大扁扇形，寬達5~6呎，15叉，重達60~95兩。角質鬆軟，因扁而奇特，不為市場接受。

有人說牠的血色帶黑，所以缺乏藥性，此種說法近於迷信，不可採信。但性喜寒帶，在台不易生存，則為事實。這是與馬鹿不同的地方。

白 尾 鹿

白尾鹿（英名 White Tailed Deer，學名 *Odocoileus virginianus Boddaert*），毛色棕色，冬綠灰，但乳鹿幼小時呈赤棕色而有明顯白斑，漸長變為一色無斑。體形中型，肩3~4呎，長4~5呎，體重150~200磅，尾臂白色，角呈彎形，二角各呈半圓形。宜溫熱地帶，善泳，壽命20年。9~11月交配，春夏生產，每胎常有2~3頭。此種鹿因多產，角圓形，4歲時有50兩餘鹿茸，亦為符合經濟原則者。但白尾鹿在美國生存不多，已明令為保護鹿種，甚至每頭有編耳號，以示重視。

農林廳肥料登記農肥字第0149號 已列內銷檢驗第302014號

濃縮液體有機肥料

日本最新進口

特奇液 夕キイ

日本タキイ (TAKII) 種苗株式會社榮譽出品

保證功效：

- * PH中性
- * 促進發芽
- * 提早收成
- * 提高品質
- * 增加收成
- * 防止蟲害
- * 改善土質
- * 無害連作

獨特成分：

* 含氮、磷、鉀微生物外、* 另有核酸、亞米諾酸、加里等高級成份。

* 完全為有機質成份。

The advertisement features a central illustration of a hand holding a bunch of grapes, with various plants like wheat and flowers growing from the palm. A small cartoon character is shown at the bottom right. Text on the right side includes "現貨供應" (Stock available), "總經銷" (General distributor), and the company name "野生企業有限公司" (Wildlife Enterprise Co., Ltd.) along with the phone number "(033) 323339-374004-6".