

，原產歐亞北部、克里米亞、高加索等地，毛色夏日赤褐，冬日則帶灰色，肩高4呎，身長7呎，重量有250~400磅（歐產者較小，肩只2呎餘）角長3呎餘，重量70~80兩，圓形。春初脫角，夏末重萌，8~9月交配，懷孕8個月，春夏之交生產。

此鹿體形為中型，茸質相傳頗優，原為飼育良種，可惜個性不易適應環境的變遷，尤不耐籠閉遠運。台灣引進國外新品種的歷史，遠可溯及8、9年前，自紐西蘭進口紅鹿，但途中死亡大半，飼育不久，又死泰半，剩餘無幾。幸賴業者苦心維持，尚餘若干，可謂碩果僅存。

又紐澳與台灣的交通頗有問題，船運必經東南亞疫區，依規定不能進口；飛機班次，從無直達，包機又因量大，風險過大。所以必須在當地圈飼多年，可免途中風險。至於二地氣候條件，亦宜細心研究或許可藉以改進今後台灣鹿種。


紅鹿體形優美，肉質鬆軟如綿羊，傳統視為上品，國際價位頗高。

## 馬 鹿

馬鹿英名 Elk，學名 *Cervus canadensis* Enxichen，俗稱阿爾泰鹿、大角鹿。在我國北方，常利用牠的獸力工作，又分為黃腎、天山、鮮卑、大夏等4種。毛色夏天黑褐，冬天棕褐，四肢下段白色，胸有長毛。

此為一種次大型的鹿，美國頗多，但隨地形的南北緯度，分為北部洛磯山一帶，體形常達1千磅以上。中部米蘇里一帶則體重降為7百磅上下。德州南部一帶，固已習慣於炎熱氣候，但體重只有400~500磅左右。

鹿角冬天脫落，春天萌長，呈圓形，偶有茸端扁平者，略呈內彎，二角寬距6呎，重量恒達10~20磅。此種鹿，以產茸壯大量特重出名。茸有粗毛被覆。韓國人認為此種鹿茸，是至高上品，單就茸量而論，亦極富經濟價值。筆者深信此種鹿類，近雖無人注意，漸次必有人引進。



馬鹿與麋鹿的分別：麋鹿（英名 Moose，學名 *Aalses cawelaides*，又種駝鹿、麀鹿。毛色夏天黑色，冬天棕褐，下肢白色，體呈巨型，肩高7呎，長9呎，重達1,200~1,400磅。頭長頸短，頸下有肉垂，長唇，高肩，長尾，角呈大扁扇形，寬達5、6呎，15叉，重達60~95兩。角質鬆軟，因扁而奇特，不為市場接受。

有人說牠的血色帶黑，所以缺乏藥性，此種說法近於迷信，不可採信。但性喜寒帶，在台不易生存，則為事實。這是與馬鹿不同的地方。

## 白 尾 鹿

白尾鹿（英名 White Tailed Deer，學名 *Odocoileus virginianus* Boddaert），毛色棕色，冬綫灰，但乳鹿幼小時呈赤棕色而有明顯白斑，漸長變為一色無斑。體形中型，肩3~4呎，長4~5呎，體重150~200磅，尾腎白色，角呈彎形，二角各呈半圓形。宜溫熱地帶，善泳，壽命20年。9~11月交配，春夏生產，每胎常有2、3頭。此種鹿因多產，角圓形，4歲時有50兩餘鹿茸，亦為符合經濟原則者。但白尾鹿在美國生存不多，已明令為保護鹿種，甚至每頭有編耳號，以示重視。

農林廳肥料登記農肥字第0149號 已列內銷檢驗第302014號

濃縮液體有機肥料 日本最新進口

# 特奇液タキイ

日本タキイ (TAKII) 種苗株式會社榮譽出品

保證功效：

- \* PH中性
- \* 促進發芽
- \* 提早收成
- \* 提高品質
- \* 增加收成
- \* 防止蟲害
- \* 改善土質
- \* 無害運作

獨特成分：

- \* 含氮、磷、鉀微生物外，另有核酸、亞米諾酸、加果等高級成份。
- \* 完全為有機質成份。

現貨供應

總經銷  
野生企業有限公司  
電話 (033) 323339 · 374004 ~ 6