

# 葡萄有那些病虫害

章加寶

## 黑痘病

(續上期)

病徵：葡萄黑痘病在黑后、巨峯、意大利、新玫瑰等品種上發生最為普遍與嚴重。尤其是葡萄萌芽時遇到雨水，此病即可嚴重發生。病原都是侵犯葡萄幼嫩部位，所以果粒長到豆粒大時即不再被害。此病於葡萄萌芽後開始發生，發病部位有葉片、葉柄、嫩梢、蔓、卷鬚及果實，葉、嫩梢的病徵最為明顯。

葉片病斑中央部份脫落而呈穿孔狀。嫩梢及葉柄上發生時，最初生褐色圓形病斑，嚴重時許多病斑相連接使嫩梢上形成許多陷坑，像痘瘡一樣。有的嫩梢頂端15~20公分全部因病死掉，影响生長甚大。

卷鬚上發病時，末期變黑枯死。最初在果實表面生淡褐色很小的圓形斑點，以後逐漸擴大。看起來很像鳥的眼睛。果實因發生此病就會變得乾燥、硬化與破裂，不但影响外觀，嚴重時失去食用價值。在潮濕時，嫩梢或果實的凹陷病斑上常生粉紅色有粘性的顆

粒狀物，即病原菌的分生孢子。

防治法：1.休眠期剪除發病的蔓燒燬。

2.休眠期噴射稀釋 800倍的波美30~33度的石灰硫黃原液，內加1%王氯化酚，用以防治枝蔓病菌。

3.注意施肥，避免多用氮肥，應充分施用鉀肥。

4.葡萄新梢如生長到10公分左右，最易發生此病。萌芽後，每隔2周噴佈74.7%鋅錳粉克(Dikar)可濕性粉劑，稀釋400倍，每公頃使用量為2.5~3公斤，但是連續霪雨時，酌予縮短施藥間隔。

但採收前2周，不得施藥。另外也可施用80%鋅錳乃浦(Moncozeb)可濕性粉劑，稀釋600倍，每公頃使用量為1.5~2.0公斤。

5.栽培抗病品種：在本省、意大利、巨峯、黑后、奈加拉與金香都是罹病品種，應加注意。

## 葡萄房枯病

病徵：發生於葡萄的果梗、果粒及葉片上，果實接近成熟時容易發生。幼小的果實也會受到侵害。歐

漁業貸款

農業機械貸款

農家小額貸款

加速農村建設貸款

# 合信倉庫

請向全省各管業單位及農漁會洽辦各項農漁業貸款

總庫·台北市館前路77號  
電話·3118811  
(分轉各單位)