



假性狂犬病猪



假性狂犬病疫苗

併發症須隨時治療

假性狂犬病疫苗的使用劑量，不分年齡、體重，1劑量一律2毫升，注射於肌肉內。應避免與其他

疫苗同時注射，宜間隔1~2周。注射後數日內，可能有體溫升高或一時性的食慾減退等反應，通常很快恢復。注意若有併發症，須隨時治療。

假性狂犬病死毒疫苗應貯藏於4~8°C的環境下，不可暴露在光線下。有效期1年。包裝有50劑量（100毫升）和10劑量（20毫升）兩種。

雜糧發展基金會 聘荷蘭工程師來華演講 谷倉安全防爆設計技術

台 澄清區雜糧發展基金會，鑑於國外時常發生谷倉粉塵爆炸，造成嚴重災害情事，最近聘請聞名世界的荷蘭鹿特丹G.E.M.工程設計顧問公司工程師范朗維克先生來華，在「谷倉安全防爆研討會」中，主講谷倉安全防爆設計技術問題。

范 朗維克先生於11月12日抵達台灣，並自13日起，由北而南訪問參觀本省較具代表性的聯華、治發、統一、大成等公司，以及公營事業員林鐵路貨運所、台糖公司小港廠、港口谷倉遠東倉儲公司

高雄港等大型谷倉設施。

「谷倉安全防爆研討會」於11月19、20兩日，先後在高雄漢王大酒店14樓，以及台中市國立中興大學農學院舉行。

會中除請專家范朗維克先生作專題講授外，同時並邀請國內專家遠東倉儲公司副總經理夏懋修先生，參與講授研討。

全省各地建有新型散裝倉庫的公私民營單位，以及政府主管安全檢查機構，約200餘人參加，對本省新型谷倉安全防爆的設計與維護，將可邁進新的里程。

近 年來，雜糧基金會為配合進口谷物的成長需要，曾先後協助公私民營廠商，增建內陸港口谷倉達百餘萬公噸，大部分屬於新式散裝倉庫，附有機械、電機、電子等設備，在儲運上已收到良好的績效。

但唯恐機電操作與維護方面，如偶有不慎，極易發生粉塵爆炸的意外災變，因此雜糧基金會經常邀請國內外專家，召開谷倉防爆講習研討，並收集資料編印專輯，分贈倉儲業者參閱，以提高警覺，加強防範。