

逸，（尤以水泥池或池堤較低者為甚）及敵害如鳥類的危害。尤其對偷釣魚者形成障礙物，減少損失。

3.能保持水溫、水質的安定，尤以夏季高水溫期為甚，同時具有人工礁的效果，池魚多集中在菜棚底下，不致於過度活動（以小型池而言）使池水混濁，影响攝餌。

4.可以依空心菜的成長情況來判斷池水質的好壞。水質良好時成長茂盛，否則會形成枯萎現象，使業者能在池魚未產生危害前，作適當的處理，減少無謂的損失。

5.為節省能源及地下水源，在飼養管理上須設法保持池水最佳狀態。一般施肥養魚，多以人工飼料來補充天然飼料不足，藉以促進池魚的成長，縮短養殖期間提高單位面積生產量。由於此種經營形態，業者為求池魚成長心切，往往易形成池水過肥，或投飼過量的現象，使池水分解緩慢，導致污染。


水面種植蔬菜，因水中含有對池魚生存有影响的氨態氮，除部份會被植物性浮游生物所吸收外，殘留的部份則由水中的細菌分解作用，把氨態氮轉變為亞硝酸態氮再變為硝酸態氮，最後利用空心菜根把



硝酸態氮予以吸收，一方面促進空心菜成長，同時使池水達到淨化的效果。

總之，利用竹棚使硬質網浮繫在水面，可隨池水升降，由於網泡浸在水中不易老化，而增加耐用年限，成本低，冬季不使用時易於收存，同時此法不僅能種植空心菜，凡是耐水性強的蔬菜不妨予以試植，而池中的魚類只要是淡水魚都可以養殖，兩者均能得到互助互利的功效，對國民生計裨益甚鉅。





泰 國

T.C.O.

純正 蓖麻籽粕

原裝進口
最佳有機質肥料
省工·省本·多利

土壤改良 兼施肥

含有成分：

氮	5.5~6.5%
磷	2%
鉀	1%
有機物	82%

適應作物：

蘋果、梨、桃、葡萄、柑桔、蕃石榴、蘆荀、枇杷、橡果、荔枝、蓮霧、茶樹、蕃茄、草莓、菸草、蔬菜、瓜類、豆類、甘蔗、蘿藦、花卉。

總經銷處：
頂新製油實業有限公司
(048)321833

台灣總代理：
泰坦企業有限公司
(02) 5361648~9