

(巳)在P E布覆蓋後，再以70%之茅草或稻草棚遮蔭，使成活率達80%以上。

(午)次年農曆3、4月間，天氣暖和時，才把P E布掀開一部份使通風（溫度28℃以上），等5、6月梅雨期才全部掀開，這時茶苗已成活。

適時噴藥 防治虫鼠

(卯)在P E布掀開後，病虫害就會跟着來到，此時可以尿素和水以1.5：100公斤稀釋液，另加1,500倍的「美文松」混合液，每周噴布苗木葉面，可預防浮塵子等害虫。

(辰)在P E布覆蓋之中，如砂面呈乾燥時，應於溝中灌水，使水份吸到畦面滋潤。

(巳)在育苗期中如遇地鼠爲害，可以蝦米沾「殺鼠靈」，放在地鼠行經的洞口餵食而予消滅（只有在天晴時才有效）。

(午)到了6、7月間，茶苗已長至7、8寸高，此時應實行摘心（2葉1心），天氣好時就予灌水及噴藥。

(未)冬至前後20天，即可將成活苗移植（雨後移植成活率較高，但須苗圃與茶園靠近較好）。

(卯)苗木剛移植後，避免噴殺草劑，以免枝條表皮因移植受傷沾藥而乾枯，這樣會影響枝條吸收水份。

施肥除草摘心 促進茶苗發育

(卯)在行人工除草前，先以複合肥料1號施於土表，然後因除草鬆土，因肥料混入土中，易被苗木吸收。

(辰)施肥後，苗株漸長，應常摘心，以免老化。

(巳)年施有機肥3次，分別在冬至前後、春茶採收完畢、及7、8月間，各施1次雞糞和豆餅。化學肥料除6月外，其餘可混入有機肥一齊施放。如豆餅與化學肥料混合施放，可避免白蟻及螞蟻搬走。

(午)冬至前後修剪茶樹成水平面，這樣可以使採茶面積較大。



採茶忙

徵求

豐年畫刊 照片

題目：親情



(特寫鏡頭·彩色黑白均可)

應徵：請寄“合北市溫州街14號豐年社葉小姐”
刊出後立即致送稿酬，不用即退還。