


10. 預防野鼠、野貓、野狗的侵襲打劫。

11. 有容量的重物，切勿放在鵝舍內，否則外表被鵝啄破後，因為部分容量溢出，導致重物傾斜而將鵝壓扁。



▲ 玉米蚜虫群集於葉背



▲ 玉米蚜虫群集於穗上



■ 莊濬瓊 ■

提高糕餅品質節省人工

本省液蛋工業急需建立

澳洲專家來台專題演講

為推動國內的液蛋工業，雜糧基金會特別在上（11）月30日，邀請澳洲蛋局董事長福吉和總經理梅恩，作液蛋生產的專題報告，並解答與會者提出的問題。

近年來國人的生活水準提高，糕餅、麵包、餅乾等食品加工業，所需使用的雞蛋原料日增，平均每日約 100 公噸。

雜糧基金會有鑑於此，為謀國內食品加工糕餅產品升級，並調節蛋類生產與運銷，預備在國內推動液蛋工業，使食品業界所需要的蛋類能按照全蛋、蛋黃、蛋白、加糖、加鹽等不同規格產品，分級供應，以減少原料污染及節省人工。

與會者包括糕餅、餅乾食品業者和雞蛋生產業者共 30 餘人參加，一致認為國內液蛋工業的建立，已甚需要，應速達成。

會中，澳洲專家並對我國將來建立液蛋工業應注意事項，提出三點建議：(1) 未來液蛋市場先以滿足國內需要為主，不要一味考慮外銷。因國際液蛋市場競爭太大，未必有利。

(2) 液蛋機械應選擇最新設備，切勿使用陳舊產品，以免影響生產作業。(3) 日後對烘焙業、糕餅業者，應加強教育，使明瞭液蛋的正確使用方法，以提高操作效率和產品的品質。

蚜虫並非玉米特有的害虫，其他作物如高粱、稻、麥、甘蔗等也有發生。蚜虫對於玉米的產量沒有嚴重的影响，但被害嚴重的會併發煤病，使果粒稔實受損。

蚜虫體暗綠色，觸角黑色，比體長還長。角狀管粗短，體長 2.8 ~ 3 公厘。在玉米生育初期，羣集於梢部心葉內為害。至雄花抽穗後，轉至葉背、葉鞘、果穗、莖等各部位吸收養液。

在天氣乾期發生多。玉米莖、雄花穗和葉部受害比較嚴重。

防治法是用 24% 納乃得液劑，每公頃 0.9 ~ 1.2 公升，稀釋 1,000 倍。或用 40.64% 加保扶水懸粉，每公頃 1.1 ~ 1.5 公升，稀釋 800 倍。

生育初期如發生蚜虫平均每株 100 隻時，即行噴藥，10 天 1 次，計 3 次。40.64% 加保扶水懸粉的施藥次數，以 2 ~ 3 次為限。