

農林廳種苗改良繁殖場各項種子介紹

產品名稱	品 種	特 性	栽 培 適 期
雙雜交玉米	台南5號	早熟、豐產、抗旱、矮生、適應性廣、適合秋裏作、不抗露菌病及煤紋病。	春2~3月 秋9~10月
	台南11號	早熟、豐產、粒大、橘黃色，適合春作及秋作，抗露菌病及煤紋病。	〃
玉 米	台南選10號	早熟、豐產、抗旱、植株較高，適合山坡地栽培、抗病力強。	〃
超 甜 玉 米	台南15號	糖度高達11~12%，產量每公頃 8,000~10,000公公斤，本省氣候全年均可種植，惟栽培時，必需與其他品種玉米隔離，以免雜交減少甜度。	全年可栽培
雜 交 高 粱	台中3號	早熟、豐產、矮性、散穗、鈍感、再生力強。	春3~4月 秋7~8月
	台中5號	豐產、矮性、中熟、抗蟲、抗病、鈍感、品質良好。	〃
大 豆	高雄8號	全生產日數 87~110天，耐銹病力中等，鈍感，莖粗大，抗倒伏，適合省工栽培，株高，中晚熟。	春2~3月 夏6~7月 秋9~10月
	高雄3號	早熟、鈍感、莢大、種粒大、植株堅硬、莢數多、產量穩定。	〃
	台農15號	早熟、株高適中、分枝及葉繁茂，可適當密植，蛋白質含量高。	〃
	台農4號	早熟、鈍感、植株堅硬、抗銹病。	〃
棉 花	斯字棉	適應性廣、纖維長、產量高。	5~7月
甘 藍	葉深	早熟、耐熱、耐病、生長勢強，但低溫處易抽苔，定植後60天可收穫，球重約1公斤。	北 部5~8月 中南部6~8月
雜 交 甘 藍	種苗1號	早熟、耐熱、抗病性強、適於夏季栽培，球扁圓形堅實重約1~1.2公斤，定植後55~60天收穫。	4~9月
雜交花椰菜	耐熱極早生45天	極早生、耐熱，適於夏季栽培，花蕾白、花梗淡綠色，球重350~500公克，定植後45天收穫。	4~5月 7~9月
	早生45天	適於夏末秋初栽培，花蕾白、花梗淡綠色，球重350~500公克，定植後45天收穫。	7月下旬~9月
芥 菜	雞心蕾	喜冷涼氣候，耐低溫，不耐高溫，春播易抽苔，秋播較宜。	7~1月
花 椰 菜	早生55天	早生、適於早秋栽培，花蕾純白、球重 500公克左右，定植後55天收穫。	8月上旬~9月
白 菜	馬耳	葉梗及葉片多汁，少纖維，耐高溫高濕，生長勢長，生長期短，美味豐產，定植後30~40天可收穫，亦適於直播。	4~10月
	青梗	葉色濃綠，纖維少，產量高，耐熱性強，適於夏季栽培。	3~9月播種
蘿 蔔	仔仔杔	耐熱、早生、根形橢圓，播種後55~60天可收穫。	4~11月
	大白杔	〃	春、夏、秋栽培
	大梅花	晚熟、抽苔晚、不易空心、根質好、根短橢圓，播後 90~100天可收穫。	秋、冬栽培

產品名稱	品 種	特 性	栽 培 適 期
雜 交 番 茄	種苗 1 號	耐高溫、抗病力強、青枯病感染率極低，適合本省夏季栽培，果重平均110公克（夏季）。	5月中～7月初。
	158	早生1代雜交種，果色深紅、茄果形，株勢健旺，耐萎凋病、尻腐病、筋腐病，果實硬度高、果重200～250公克。	平地8～2月 中南部9月中～1月中 高冷地夏作3～4月
	160	早生1代雜交種、果形整齊、豐產、耐萎凋病和尻腐病、色味俱佳、果重150～200公克。	〃
	5094	1代雜交種，果色粉紅，生長性強，抗病力強，產量高而穩定，糖度高，果重180～200公克。	〃
木 瓜	日隆	結果力強，畸型果小，紅肉，甜度高，早生，定植後8個月即有收成，株高76公分即結果。	北部3～5月播種中南部除1～2月外均可。
無子西瓜	4608	生長勢強，抗白粉病、露菌病、炭疽病，耐寒在15°C下仍可正常生長，分蘗早，若果早，果圓形，皮青黑色，肉色深紅，皮薄，耐儲運。甜分高達11～12度，沙脆可口，風味佳，產量每公頃達48,600公斤。	
西 瓜	紅雲	具密實系統特性，果橢圓肉深紅，生長強健，抗病力強，產量高而穩定，果皮光滑青黑色，果皮薄而硬，耐儲運。	北部3～5月 中部2～5月 南部1～2月 9～10月 東部1～2月
	紅娘	生長勢、抗病力特強，耐旱，果肉鮮紅、品質風味好，結果力強，果皮淡綠網紋，產量高，耐儲運。	
牧 草 種 子	單葉豆	可放牧或製乾草，亦為良好的果園覆蓋作物。	5月
	燕苔	喜濕涼氣候，12～20°C最理想，自微鹼性至強酸性的各種土壤均宜，故海岸砂土與高山紅粘土都能生長良好，除氣溫上升或發生芽蟲外，很少病害，可供人畜食料或青貯。	平地9～12月 高山5～7月
	白花三葉草	多年生，深根豆草，生育強健，長有匍匐莖及白色球狀花，為潤濕帶地優良牧草，酸鹼度為中性（pH5.5～6.5），與禾草混作青刈，果園間作，可作家庭放牧之用。	春4～5月 秋8～9月
	苕子	2年蔓生豆科，適各各種土壤，為酸性紅土良好冬季豆科作物，亦宜鹽分地，海拔1,500公尺以下平地山地均能生長，為優良飼料，牛、豬、雞、火雞、鵝、家兔均嗜食，曬乾、青貯均可，亦可作冬季裏作綠肥。	9～11月
	黑麥草	1或2年生，但自播性強，故草地建立後一如多年生。適溫暖地帶，過冷、過熱、過乾、過濕均非所宜。以肥沃粘土最佳，耐酸性，在pH5的土壤仍然繁茂。混植生長快，可青刈或乾貯，適於1年期內短期牧場，為其具價值「冬草」。	9～11月
	紅燕麥	為秋播越冬2年生禾草，似燕麥，但分蘗性及抗銹病較佳，生育健旺，燕麥適於冷涼氣候，紅燕麥則可在南部突破燕麥後期乾旱及稍高濕度的適應界限，故以冬季栽培為宜，對土壤適應性大，耐瘠薄土，除砂土及石灰土外均生長良好。為良好的冬季青飼料或青貯草。	9～11月
	賽翹豆	全省海拔1,000公尺以下均宜，播種或扦插均可，為多年生蔓性攀緣豆科植物，但初期生長迅速，習性與他種豆科迥然不同，且對氣候及土壤適應性強，霜害後復生亦迅速。	5月 春、夏
	埃及三葉草	牧草、綠肥兼用，生長迅速，適於中北部水田冬裏作，果園冬作及秋植蔗田間作綠肥及牧地的冬季豆科，可與燕麥、黑麥草混播。分多刈與單刈兩種型系，一為播種後在春季刈1次的單刈型。一為多刈型，播後50天始刈，此後每30天刈1次，最後1次5月收穫。	2期水稻收穫前後 5～10天
	芥菜	產量豐富，為春夏之交適宜新鮮飼料，宜冷涼氣候，若高濕多濕之地，雖地上部分生育旺盛，但地下部分產量減少，適當平均溫度12.5～19°C，表土深又具有適量溫度的砂土，或植質壤土有適度腐植質的砂土或石灰土頗良好，粘重土發育不良。莖葉可曬為乾草，塊根製漿。本省地區可用作秋播的冬作。	8～9月
	泰樂豆	生育強健，耐低肥力土地，自播性強，可與多種禾本科牧草混作。作水土保持或牧野改良。	在潤濕適當時機，全年任何時期均可播種，本省南部以4～6月較適，但幼苗怕霜，故盡量避免遲播。
	營多藤	為1種溫暖地區的多年生豆科植物，適宜在果園中種植作為覆蓋作物，覆蓋全面後，可開始刈取約1尺長的嫩枝葉供為兔、雞、豬、牛青飼料。	3月～10月間播種

產品名稱	品 種	特 性	栽 培 適 期
牧 草 種 子	燕麥台大1號	中熟生育期比燕麥可早約30天，始穗期約播種後70~80天，可刈1~3次，每公頃青草量35~50公噸，穀粒產量4.3~6.3公噸。	10~12月
	苜蓿	一般均認為平地草，但1,000公尺以下山坡地亦適宜，惟幼苗柔弱，種植前應清除雜草。若土壤缺根瘤菌，種植前應先接種，播種後應注意排水，忌高溫多雨。若供放牧，應與禾草混種，以免發生腹脹症，亦可作乾草用。	春2~3月 秋10~11月
	太陽麻	1年生草，高2~3公尺，每公頃可收鮮草20,000~30,000公斤，肥料成份為N-0.37%， P_2O_5 -0.08%， K_2O -0.14%，任何土質均宜，但需土層深排水良好，砂土較佳，最宜高溫多濕地區，有再生能力，可多次刈，為夏季理想繁肥。	
備考：雜糧作物栽培時間，南北氣候不同，可視氣溫酌予提早或延後。			

台灣漁業現況

· 余明村 ·

台灣漁業，在政府與民間共同努力之下，致力於漁業技術的改進，漁產量逐年提高，台灣漁業在現階段已有長足的進步。

台灣具有發展漁業的最佳環境，不論遠洋、近海、沿海岸的漁業，或水產養殖業，都有可觀的成績。

歷年來在政府與民間共同努力之下，鼓勵民間投資，增建大型漁船，開闢新漁場，促進國際漁業合作，及改進漁具、漁法，並運用加強農村建設計畫經費，獎勵沿岸及

近海漁船裝置新式設備。因此漁業產量年年提高，每年漁業的成長率，平均達10%左右，已奠定漁業發展的基礎，並逐漸負起國家經濟建設的重要任務。

台灣漁業69年總生產量達93萬6千餘公噸，（其中外銷23萬餘公噸，僅值美金7億4千萬元），國人所需動物性蛋白質中，約一半取之於漁產品。

由於漁業發展的進步，對人民生活的改善，已有顯著的貢獻。

歷年來漁業科技的重要成就略

有：

1. 使漁船動力化與現代化。
2. 改進漁撈技術。
3. 調查與開發新漁場。
4. 調查研究漁業資源。
5. 投放人工魚礁，培育沿岸資源。
6. 改進建造技術。
7. 改進養殖技術。

使台灣漁業在現階段，獲有相當輝煌的成績。

政府今後將再從提高魚貨鮮度，改善運銷方法上努力，以穩定魚價，增加漁民收益。並對加強漁業資源的維護與調查，取締非法捕魚，開發新漁場，更積極進行多方面對外漁業合作。改變現有小規模經營方式，實施企業化經營，以及提高我漁船船員待遇與福利等措施，以期我漁業能保持高度發展。（台灣省政府農林廳漁業局位於台北市忠孝東路1段8號及青島東路1~3號，電話：2319511~7，漁友們對漁業如有不瞭解之處，歡迎來局，來信或電話詢問）。

