

(3)有極少數的母猪，生過兩胎，每1次生小豬，總是生3~4隻，這是否與母猪子宮的長短有關？依經濟觀點來看，應否淘汰？（嘉義縣朴子鎮天星新村82號林國彰）

(1)母猪流產的原因很多很複雜，懷孕早期流產，主要原因為細菌性（布氏桿菌症、鈎端螺旋體症等）及病毒性（腸毒性、假性狂犬病毒、小病毒等）或原虫性（錐虫、弓虫）等感染病外，營養缺乏（維生素A、E及各種礦物質等）與毒血症、遺傳、管理、以及母猪產道方面疾病等等都會造成流產。

這些原因引起流產，母猪多不見有病態，所以飼養頭數不多且零星發生的流產很難找出病因。如有普遍發生時，應請縣政府疾病防治所診斷病因，然後接受指導防治方法。

一般預防流產，宜自下列各項着手①應注重衛生管理，不要讓病原侵入，使母猪感染疾病，②飼養完全飼料（飼料可靠飼料廠出品之飼料），③避免近親繁殖，④淘汰劣質遺傳性種畜。

(2)預防離乳後下痢，應採取緩和離乳法，即不要行急激的離乳，離乳時至少有2~3天緩衝期，例如先白天將母仔分開（隔開），不可吸乳，晚上讓仔豬回到母猪身邊。2~3天後始可將母猪趕送完全分開，仔豬繼續在原豬飼養，這時管理需特別注意，不要潮濕，天氣冷要保溫，經過1~2天後始可換欄。移動後，待4~5天後，仔豬已習慣新環境，才開始慢慢換飼料。換飼料應有3~5天緩衝期，先從少數開始。離乳前後仔豬飼料中，應加啞羅肥等補助飼料7~10天。

(3)母猪生產頭數太少的的原因，除了配種或人工受精的技術及時期不適當之外，微生物或母猪本身劣性遺傳引起胚胎早期死亡也是重要原因。

這與母猪子宮長短似無關係，母猪子宮的長短差距不會很大。你的母猪經二產都一樣，就應該淘汰更新比較有利。（張聯欣）



豐年社 漁牧叢書

家畜家禽衛生

介紹牛、羊、豬、雞、鴨等病因、症狀、防治法，及禽畜一般衛生管理。

精裝定價160元

火雞飼養

火雞飼養育種專家台灣省畜產試驗所家禽系主任簡明龍執筆，介紹火雞品種、種火雞繁殖、種蛋孵化、飼養管理、營養及飼料、疾病防治、火雞肉營養價值、銷售方法及食譜。

定價140元

肉鴿飼養

本書特請農發會養鴿專家黃暉煌技正執筆，介紹肉鴿品種、鴿舍設計、籠飼設備、飼養器具、飼養管理、繁殖配對、選種方法、疾病防治等技術，及肉鴿食譜。圖版多，封面彩色，25開本。

定價65元

水產養殖

介紹鱧魚、塘虱魚、鯰魚、福壽魚、虱目魚、花跳、鰻魚、草蝦、蟳、蚶、文蛤、牛蛙、龍鬚菜、鱸魚、泥鰍、田螺、鱧草魚、蜆、烏魚、九孔、紅鱒魚、石斑魚、紅目鱸、鱖、香魚等養殖技術、魚的食譜等。

定價150元

台北市溫州街14號

郵政劃撥5930號

每次郵購加掛號郵資9元