

分的播種溝，或順畦向作行距45公分的播種溝，撒施基肥的化學肥料，然後覆土，再寬行的條播，覆上1.2公分土後鎮壓。櫻桃蘿蔔也適於撒播栽培。

發芽後疏去密生部份的苗，本葉1~2葉時，作第二次疏苗，使有4~6公分間隔，高溫期寬，低溫期狹些。疏苗兼行除草，施尿素稀釋水。

第二次疏苗要在本葉二葉前，不然葉片徒長，影響根的品質。

乾燥期在傍晚澆水，或作畦溝灌溉。櫻桃蘿蔔在高溫時期可與其他作物間作。

栽培期間最重要的是：全生長期土壤要有適宜的濕潤，並施速效性肥料，不宜中斷肥料。尤其在高溫時期，缺少水份或過於乾燥會發生糠心及抽苔。

未糠心前採收

肥料： 櫻桃蘿蔔生長期間短，栽培地要肥沃並且含多量有機質，堆肥要完全腐熟，追肥施液肥。堆肥與根直接接觸，會使根發生分根或使根表皮變粗，必須在耕耘前撒施，充分混合於土壤中。

肥料的標準用量——每10公畝地基肥：完熟堆肥1,500公斤，硫氨35公斤，過磷酸鈣60公斤，氯化鉀25公斤。追肥：尿素15公斤，以液肥施用。

收穫： 從根直徑長大至2公分時開始採收，除去枯葉，用清水洗淨後，將6~8株束成一把，包裝後送往市場。

高溫季節很易糠心，失去商品價值，必須在未糠心前採收。10公畝地產量1,500~1,800公斤。

嚴守停藥日數

虫害： 生长期會發生黃條跳虱、青虫、夜盜虫及蚜虫等。因櫻桃蘿蔔是生食的，須遵守停止施藥日數。防除用藥劑任選：

(1)35%安殺番乳劑，1,400倍液。採收前21天停止施藥。

(2)30%馬拉松乳劑，600~1,000倍液。採收前4天停止施藥。

(3)50%二氯松乳劑，1,000倍液。採收前4天停止施藥。

(4)50%達馬拉溶劑，1,200倍液。採收前14天停止施藥。

病害： 主要病害是腐敗病，噴施65%鋅乃浦可濕粉劑400倍液。採收前7天停止用藥。

台灣的蝴蝶

陳維壽著

介紹蝴蝶標本及工藝製作，彩色蝴蝶圖說120種，中英對照，附台灣產蝶類總目錄。

(精)250元(平)220元

增訂三版

台灣觀賞植物集

介紹常見觀賞植物150種，彩色精印，中英文對照，附栽培法。三版內容修訂，部份照片更換，另增植物特性/栽種/用途一覽表。

(精)300元

台灣鄉土引

許柏修著

介紹台灣千變萬化的地形景觀、水土保育的地理景觀及環境衝擊的城鄉景觀，圖版多，內容豐富。

定價100元

增訂再版

台灣的野生蘭

蘇鴻傑著

介紹90種台灣野生蘭的鑑賞、栽培、繁殖。彩色精印，中英對照，為愛蘭者不可缺少的參考書。

(精)180元·(平)150元

台北市溫州街14號

郵政劃撥5930號

每次郵購加掛
號郵資9元

台灣的海水觀賞魚

劉振鄉著

介紹海水觀賞魚的認識、功用、飼養、魚病治療、撈捕、儲運、魚資源保護、海水魚淡化。

(精)300元

豐
年
社