

1.第1週期誘發菇蕾處置不當：參觀了澳洲4個洋菇場，第1週期的產量都占總產量一半以上，反觀本省菇農的第1週期產量普遍偏低。主要原因是不明出菇原理，對第1週期誘發菇蕾處置不當，並因而使第2、3週期菇變小而多。

2.要將堆肥整平、覆土厚度均勻，濕度一致：爲了使第1週期菇多而大小均勻，必須將堆肥整平，覆



——覆土厚度要均勻——

土厚度均勻，濕度要一致。未誘發出菇前，洋菇菌絲應在覆土內充分生長，覆土層積有足量的二氧化碳，然後突然排除菇舍內的二氧化碳，通入大量外氣，降低空氣及菇床溫度，即可誘發形成菇蕾。在此情況下產生的菇蕾，大小相差不多，可同時生長發育，提高第1週期的產量。

3.覆土後過分通風，覆土太乾：本省菇農大部分在覆土後過分通風，致覆土太乾，無法累積相當濃度的二氧化碳。而且堆肥與覆土厚度不均勻，以致覆土層的二氧化碳分布極不均勻。大量通風換氣時，導致菇蕾形成不一致，大小相差太大。大者先發育，其周圍的小菇則無法發育，必須待第2週期才能發育，以致第1週期產量低，而第2、3週期產量雖高，但菇體太小，增加採收工資。

### 覆土材料在覆土時含水分不足

澳洲洋菇場，覆土材料在覆土時，即已含有足量水分，覆土與堆肥的接觸良好，覆土後堆肥內的菌絲可迅速長入覆土層內。

因覆土材料濕，覆土後，洒水次數及量均可減少，可以減少破壞覆土的物理構造。

## 果蔬農友大福音！從開花、結實到豐收——儘管找台和！！

葉面施肥·亦可混合農藥使用	<p>有機質 磷鉀肥 魚精 <b>開花肥</b> 0-10-10</p> <p>促進花芽分化——果樹催早花 效果奇佳 花蕾肥碩、開花旺盛——着果良好 結實大</p> <p>美國ALASKA魚肥公司 出品</p>		◆詳細資料歡迎函索◆
	<p>果樹·蔬菜用 <b>花寶(HYPONeX)系列!!</b></p> <p><b>花寶二號</b> 20-20-20 促進果實肥大 糖度增加</p> <p><b>花寶三號</b> 10-30-20 促進開花 增加着果率 結實良好</p> <p>美國The HYPONeX Co., Inc. 製造</p>		
地面撒佈 使用方便	<p>《最新奇 特殊土壤改良劑》 ——改善水果品質的秘方—— 促進着色 提早成熟 糖度增加 強健植物生理機能 增強貯藏力</p> <p><b>鈣元 CALGEN</b> カルゲン 日本ネオゲン株式会社 製造</p>		高單位鈣質 改善土壤 控制氮肥 防止徒長
	<p>——各種農業(園藝)肥料、藥品、器材總匯——</p> <p>台灣總代理 總經銷 <b>台和園藝企業股份有限公司</b> Taiwan Horticultural Co., Ltd.</p> <p>台北市士林區中正路104巷1弄2號 台中連絡處：台中市三民路一段164號</p> <p>郵政劃撥：101360 電話：(02) 831-3302 電話：(042) 223374</p>		