

有效成分之一「丁基拉草」農藥原體為淡黃色油狀液體，可溶於有機溶劑；另一有效成分「必芬諾」農藥原體為結晶固體，不溶於水，可溶於有機溶劑。7%混合粒劑成品農藥為灰白色顆粒。

2. 使用方法及範圍：

使 用 方 法	使 用 範 圍	注 意 事 項
每公頃每次用藥量	移植本田雜草：水稗、球花蒿草、鴨舌草、牛薊毛、母草、螢蘭、瓜皮草	一、插秧前處理可兼用於插秧後處理。 二、施藥時期及方法： 1. 插秧前2~4日蓋平田面後保持3~5公分水深施藥，並保持積水至插秧。 2. 插秧當日排水，插秧後灌水3~5公分保持3~5日。
30公斤		
30公斤	移植本田雜草：水稗、鴨舌草、球花蒿草、母草、紅骨草、牛薊毛、螢蘭、瓜皮草。	一、插秧後處理。 二、田面雜草之生長狀態：萌芽至一葉時。 三、插秧後日數：第一期作1~4日；第二期作1~3日。 四、積水日數：3~5日。

3. 毒性：「丁基拉草」急性經口毒性LD₅₀ 對鼠3,120毫克/公斤；「必芬諾」LD₅₀ 對鼠6,400毫克/公斤。

豐年社代售農發會叢書				每次郵購另收掛資 9 元 台北市溫州街 14 號 郵政劃撥儲金 5930 號	
書 名	定價(元)	書 名	定價(元)		
南極蝦加工利用研究(一)	100	台灣產之對蝦類	120		
南極蝦加工利用研究(二)	100	台灣水產加工業實況	150		
台灣產水產加工品質衛生研究報告	100	水產細菌學	100		
魚病研究專集(二)	100	中層拖網魚業的漁具漁法研究	100		
魚病研究專集(三)	100	台灣水產加工研究報告專輯	150		
鮪類國際組織及資源管理概況	40	乳牛平衡日糧手冊	60		
Fishery Products of Taiwan	80	水稻病蟲害：生態學與流行學	(精裝) 250		
稻作病害	(平) 250	灌溉排水工程設計	上下冊 450		
台灣植物主要害虫圖說	120	家畜病理學圖譜	中譯版 100		