

至最下葉基部，最好在早晨或傍晚，陰天時也可以作培土工作，勿在炎日下，土乾而熱，較易影响生育。

肥料：基肥每10公畝用腐熟堆肥2,000~3,000公斤，硫酸銨40公斤，過磷酸鈣90公斤，氯化鉀20公斤。栽植後4~6周及8周追施營養液，以每1公升水，溶解硫酸銨6公克，過磷酸鈣12公克，氯化鉀2公克，每穴灌約300C.C.，則可使植株發育健壯茂盛。

病虫害防治

葱主要的病害有锈病、紫斑病及露菌病，尤其在3~5月間锈病發生嚴重，葉表皮露出黃紅色粉狀物，是為锈孢子堆，可傳播，一般氣溫涼爽時發病多，可用65%鋅乃浦可濕性粉劑400倍；大生31500倍，50%賜加落可濕性粉劑1,500倍；47%三得錳可濕性粉劑1,000倍，在發病初期，每隔7天噴施。

在4~5月間紫斑病猖獗，葉最初呈現小型褐斑，漸擴大成紡錘形褐色病斑，邊緣為紫色或紅色，上下兩邊稍黃化，在高溫多濕時發生，其病斑上有孢子，可傳播，可用65%鋅乃浦可濕性粉劑400~500倍；6~6式波爾多液，75%四氯異苯腈可濕性粉劑400倍防治。



大 葱

虫害有薊馬及葱潛蠅，可用80%馬拉松乳劑1,500倍；50%賽達松乳劑1,000倍；90%納乃得可濕性粉劑3,000倍；真性好500~1,000倍，在定植後，每隔7~10天噴藥1次。


注意葱的病虫害防治噴藥時務需加沾著劑，因葱的葉表面腊質多，光滑，藥液容易溜滑掉而無法顯出藥效，加沾著劑，使藥液可長期附着於葉表，才有藥效。

以上病菌孢子均易殘留田間，傳染病害，所以種葱最好避免連作，苗床撒布藥劑，多施有機質，並合理施肥，使發育健全強壯，抗病強。

徵求

豐年畫刊 照片

題目：親情



(特寫鏡頭·彩色黑白均可)

應徵：請寄“台北市溫州街14號豐年社葉小姐”
刊出後立即致送稿酬，不用即退還。