

美國梅花鹿

飼養法

• 姚守成 •


鹿場準備及管理

美國梅花鹿為大型野鹿，性喜空曠的場地活動，不可在水泥地的密閉小屋圈飼，使牠不能取得充分的陽光與空氣。因此，鹿場宜廣闊，四周並以鐵絲網或原木條圍成高達300公分的圍牆，亦即下圍 150~180公分高的鐵絲網，上加置 150公分的刺鐵絲或尼龍網，每30公分一條。

如限於材料，不能高至 300公分，則全面罩以尼龍網或細鐵絲網，亦可防止鹿的跳逸。

鹿舍頂最低150公分

場地宜乾燥，並舖以砂土。有 5 頭鹿的鹿場，場




地宜在50坪以上，設備上需有約10坪的簡單鹿舍，舍頂最低處要有 150 公分高，以免牝鹿發茸時觸碰。

鹿舍地面宜略高而堅實，設置飼槽和水槽，門宜雙重，以免逸出。環境宜靜謐無譁，如有一小部份雜樹蔭蔽更佳。

飼料及給食

凡牛羊的飼料均可食用，但雞豬的飼料則不宜用。因為反芻動物不宜用抗生素及多量的澱粉物質，否則胃力減弱或漲噎，引起下痢、失健。

母鹿飼養不宜營養過多，以致體肥引起不育、難產等症。茲將常用飼料及配量列表如下頁：




鹿場鐵絲網設計

鹿場與鹿舍的設計

	主要飼料	精飼料	特殊加添料	水及補充飼料
飼料名稱	鮮草、牧草、樹葉、甘藷尾葉、甘蔗尾葉	花生麩、玉米、玉米碎、胡蘿蔔	糖、赤糖、素、維生素	食鹽、骨粉、內分泌、酵素、魚肝油
給量(冬)	3.0公斤	1.0公斤	0.1公斤	新鮮食水、廢棄的果皮、菜葉
給量(夏)	1.5公斤	1.0公斤	0.1公斤	任意供給

鹿的飼料調配可較自由，但宜多變化以便攝取多種營養料。鹿的食量大，為便於供應，宜種植牧草。大致上，豆科植物的營養較好，但產量少；禾本科栽培却較粗放。茲將牧草的成長及種植條件簡述於下：

品 種	適 合 種 植 地 區	利 用 季 節
盤 古 草	海拔 500公尺以下	4. 10. 月
狼 尾 草	海拔1500公尺以下	4. 10. 月
南 非 鶴 草	海拔1500公尺以下	3. 11. 月
鐵 線 草	海拔 500公尺以下	4. 10. 月
哈 定 草	海拔500—2000公尺	全 年
黑 麥 草	本省北部500—2000公尺	“ “
青 刈 玉 米	海拔 500公尺以下	3. 11. 月
蘇 丹 草	全省可灌溉之地區	全 年
大 芻 草	海拔1000公尺以下	“ “
熱 帶 葛 藤	本省東南部及東海岸	“ “
山 珠 豆	本省中南部及東海岸	3. 11. 月
營 多 藤	海拔1000公尺以下	全 年
紫 雲 英	北部休閒之水田	3. 4. 月
苕 菜	台南以北海拔1500公尺以下	3. 5. 月



鹿場宜有雜樹遮陰

疾病防治

鹿場的大小和管理，影响鹿體健康很大，運動場不宜太小，以充分接受陽光和露水為度。酷暑的天氣宜灑水以降低溫度。

為避蚊蚋，最好在鹿舍裝設紗窗、門。本省鹿場虫害以吸血小蒼蠅最普遍，宜噴灑對鹿體無害的殺虫劑，徹底的方法就是裝設紗門窗。

食槽、墊草宜常整理清掃，並須有水池供牠潔身或以水喉噴水洗鹿，以維清潔。

鹿病以消化系統疾病最常見，如食滯、鼓脹、消化不良、腸炎、下痢、便秘或中毒。其次是不發情、不孕、流產。如有上述症狀，應延請獸醫診治對症下藥，切勿購買成藥，尤其特效藥、抗生素不宜飼用，以免殺滅胃內微生物，反加重病情。

鹿的傳染性疾病，如口蹄疫、結核病、豬丹毒、牛瘟等，亦宜與獸醫商討適時防治。



鹿場要廣闊