

如何消毒猪舍？

張聯欣

除猪舍本身必須消毒外，進入猪舍的人必須消毒手、衣物和鞋，車輛駛入前也要予以消毒。

猪舍消毒的程序


設消毒槽消毒池

手和衣物的消毒——進入猪舍前，必須更換工作衣，外賓則須加穿一件場方指定的外衣。用1~2%的陽性肥皂液，或其他對皮膚無刺激性的消毒水洗手，並噴霧於衣服後，才可進入猪舍。

鞋的消毒——猪舍前需放置踏脚消毒槽，槽內盛裝深20公分以上的消毒液，踏浸時並浸到長鞋上方，且至少浸15秒。消毒液以鹼水最好，並須經常更換。

進出車輛的消毒——外來的車輛必須駛入消毒池，使車輪轉過消毒水。消毒水最好是鹼水，可保持長時間的效果。消毒池應有屋頂遮蓋陽光，以維持藥效。也可用噴霧器噴霧煤酚、汎福露液等消毒液，於車輪、車底、車身等消毒。

猪舍的消毒——猪舍應遵循下列順序消毒。



消毒豬舍應注意，最好是整個豬舍放空後消毒，若無法放空整棟豬舍，則將豬吊欄集中一邊，空出若干豬欄後再進行消毒。消毒完畢，再消毒吊欄，如此輪流消毒至整棟豬舍完成消毒為止。

鹼水須沖洗乾淨

首先鹼水裝入蓮蓬頭筒，撒洒整個豬舍地面、牆壁和所有設備，使附着的糞便充分泡軟後，才容易洗刷。刷過後用自來水管反覆充分沖洗鹼分，如果沖洗不充分留下鹼分，極易浸蝕地面和欄柵等金屬設備。

火焰燒灼消毒，須等待豬舍充分乾燥後進行才有效。燒灼點必須是火焰溫度的最高點，約距噴火口1~1.2尺處，溫度在1,000°C以上。

火焰在燒灼點須停留5~6秒，才能將病原微生物燒死，尤其空隙或空洞和角落等處，要充分燒灼。

火焰消毒勿漏燒

火焰燒過的痕跡不易看，很容易漏燒而失去消毒



消毒前須先放空豬舍

作用，所以必須小心按順序移動火焰，以免有漏燒情形發生。

消毒藥水的噴霧，應準備充分的液量，使每個角落都噴濕，包括屋頂（天花板）、柱子、欄杆、附設設備（飼料槽、水槽、保護架、燈）和清掃器具，以及走廊、污水槽等。

雜糧基金會推動雜糧生產重點

機械化 / 推行輪作

綜合技術改良 / 種子繁殖

台灣區雜糧發展基金會今(71)年決定，提撥事業費8,000餘萬元，推動雜糧增產。

在與農發會、農業局、省農林廳和有關農業改良場所、研究機構，共同研討後，決定今年工作重點包括(1)促進雜糧機械化生產，(2)輔導雜糧經營改善，(3)加強雜糧種子生產，(4)提高雜糧單位產量，(5)雜糧基本資料調查和新產品開發等5項工作。

據了解，雜糧基金會除繼續提撥專款，配合政府辦理玉米、大豆保證價格，以提高農民的生

產意願外，並配合現階段雜糧生產，實行多項措施。

在雜糧機械生產方面，過去已推廣玉米、大豆機械播種，已累計7,000多公頃，今年將擴大面積，並包括玉米、大豆、高粱和落花生等。

同時將機械作業如整地播種、施肥等，實施一貫化，以降低生產成本。為使此項工作有效推行，今年將大量購買機械，並組訓農機代耕隊予以配合。

在輔導雜糧經營方面，將着重於雜糧適地適作生產的輪作型態，

以配合稻田轉作。此項計畫將在轉作的稻田，推行高粱、玉米和大豆等輪作的大面積示範。

在提高單位產量方面，除注意雜糧高產品種的示範推廣工作外，並將在山地和東部玉米低產地區，推動更新品種、適量施肥和防治病虫害的集團綜合改良示範。

在加強種子生產方面，近年來在雜糧基金的協助下，全省雜糧所需種子供應無缺，今年將再撥款以配合急需的種子繁殖。同時並改善種子生產設備，以改善種子品質。