雨量，可提高萌芽率及增加產量。最低年雨量 280～310公厘，雨量分布均勻爲佳。採收前，若連續陰雨，將影响其澱粉生產率。

3.溫度：樹薯是熱帶作物，性喜溫暖，生育期間溫度在27～28℃以上最理想，年平均溫有20℃以上，始可有良好生育。若生育期間溫度太低，樹薯生長柔弱，塊根纖細，產量低落。

4.日照時間：樹薯塊根生育及澱粉貯積，與日照時間長短成正相關關係。日照時間的長短，也影响樹薯產量的多寡，樹薯生育期間，每日日照時間有14小時以上時，有助於塊根肥大及澱粉的貯積。

5.肥料需求量：樹薯雖耐瘠，但適量的施用肥料，有助於樹薯塊根產量的提高。台灣屬亞熱帶地區，土壤中有機質分解較速，地力一般較貧瘠，所以栽種樹薯，若補充以肥料，對提高產量效果至爲明顯。

一般地力，每公頃年肥料需求量，第1年氮肥72公斤，磷酐45公斤，鉀肥90公斤。第2年氮肥24公斤，磷酐10公斤，鉀肥30公斤。

栽培管理方法

1.選地：山坡地、平地屬黏土、赤土、砂壤土排水良好者都可種植。排水不良地，易導致塊根腐爛。

坡向以向南者較向北者佳，收穫時塊根澱粉含量較高。新砍伐林地種植樹薯，產量很好，果園間作樹薯，只要遮蔭不太嚴重，也可有良好收量。

2.整地：平地或坡度小的薯園，可以曳引機或牛犁翻耕耙平，然後視地力肥瘠作成畦寬1.10～1.25公尺，畦高30公分。坡度大或不適曳引機或牛犁操作的土地，可用人工掘穴鬆土。砂礫地不適作畦或掘穴種植者，可用鋤頭作成丘形，供插植樹薯苗。

3.種植期：春植在2～3月間，秋植在8～9月

埔里選1號品種的塊根

Ascophylliumnodosum

挪威原裝進口來台
現貨供應……。

from the LAND of the MIDNIGHT SUN ®

• 最新開發促進植物體高蛋白化作用。
• 純天然有機質，含有氨基酸、維他命、醣類等60種以上微量元素。

一、挪威海藻產品，提供您高收益的農業……（アルギット農業資材）。

▲海藻肥® アルギット® ALGIT
培養活性的土壤，健康的作物。可在作物中耕時期或作物移植，定植時均可使用，每分地25～50kg施用，穴植每株約0.5～1公斤施放。

▲海藻精® アルギフェート® ALGIFERT
特殊肥料葉面散布，稀釋5000至10000倍，使用係純天然性（高蛋白化）有機質物，可與殺蟲劑、殺菌劑混合使用，半小時內植物可完全吸收。

二、最新科技的結晶產品

▲安樂力肥® RBパワー

▲神協來肥® ラッカーライト

遠東區總代理 神協產業株式會社
台灣區總經銷 松洲化學工業社有限公司 誠徵縣市經銷商
豐原市豐勢路944號 TEL (045) 224792 （詳細資料備索）