

## 丁拉芬諾混合粒劑

### 丁拉芬諾混合粒劑 (6.5%)

「丁基拉草」(Butachlar)與「必芬諾」(Bifenox) 2種有效成分的混合劑(試驗申請人:孟山都公司台灣分公司),單劑在國內已核准使用。該種混合劑兼具防除尖葉及闊葉雜草的特性。

1.有效成分與理化性狀:

普通名稱	劑型	有效成分	含量%
丁拉芬諾 (混合)	粒劑	(1)Methyl-5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoate.....2.5% (2)2-chloro-2,6-diethyl-N-(butoxy-methyl)acetanilide.....4%	6.5

6.5%混合粒劑成品農藥為紅褐色顆粒。

2.使用方法及範圍:

使用方法	使用範圍	注意事項
每公頃每次用藥量 30公斤	移植本田雜草:水稗、鴨舌草、球花蒿草、母草、紅骨草、牛筋毛、螢腦。	一、插秧後處理。 二、田面雜草之生長狀態:萌芽至2葉時。 三、插秧後日數:第一期作2~6日;第二期作2~4日。 四、積水日數:3~5日。

3.毒性:「丁基拉草」急性經口毒性 LD<sub>50</sub>對鼠3,120毫克/公斤;「必芬諾」LD<sub>50</sub>對鼠6,400毫克/公斤。

