

3.防治方法：防治本病，應先確定是否為毒素病，再行處理。的確是發病的菇舍，應密閉後，以70℃蒸氣，全菇舍消毒12小時以上，菇床及菇架以五氯酚鈉藥劑噴洒，並清潔菇舍四週的環境，清除害虫，以免來年再發生。

六·腦 菌

本病菌是目前洋菇栽培上，發生嚴重，而仍無對策的菇床病害菌。雖然不為害菇體，但在菇床上與洋菇競爭生存環境，使之不出菇或減產。

1.病徵：腦菌的發生，初期無任何徵兆，下種後的菇床，洋菇菌絲生長旺盛，而腦菌菌絲也可能生長。覆土後，應有幼小菇體出現時，却出現白色腦菌的子實體，所以稱為腦菌。

此種子實體不僅發生在覆土表面，在堆肥內也多，尤其在床架邊緣，或架底部的縫中，更為肥大。堆肥中一旦發生腦菌，則洋菇菌絲消失，且堆肥變潮呈黏膩黑色，並有特殊的氣味。


腦菌子實體，初期為白色或乳白色，後逐漸成熟，色深而繃縮開裂，最後自溶而消失於堆肥覆土中。

2.傳染途徑：本菌的主要傳染途徑，為堆肥製作時在土場上進行，夾帶菌孢子於堆肥中，由於它的子

囊孢子能耐高溫，所以堆肥後發酵並不一定能殺死孢子，在洋菇生長期仍能發芽生長，而造成為害。

3.防治方法：防治本害菌，預防重於治療，曾發生的菇舍，堆肥清出時，應先行蒸氣消毒處理，栽培舍以五氯酚鈉全面噴洒，最好菇舍材料浸於藥中，再行搭建。堆肥製作儘可能在水泥地上進行，阻隔腦菌的污染。


調節栽培期，以減少發生的時機，也可收相當時效。其他推廣於病害防治的措施，應徹底執行，以減少本害菌發生的機會。



腦 菌

品質的保證

商標




註冊

信譽的標誌

元良牌

機水送霧噴力



可申請農機補助貸款
檢驗局品管合格外銷工廠

特殊防銹處理·適合下列各種用途：

- △噴灑各種農作物之病虫害防治藥劑。
- △噴洗牛、豬、鷄舍之清潔、消毒劑。
- △機車、耕耘機、汽車之清潔沖洗。
- △山坡地及高地之送水灌溉。

元良機械股份有限公司

台中縣大雅鄉中清路一段185號
電話：(045) 661406~8(三線)